

HO-LEN-COMPLEX®

Muco-cyl® - Tropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Muco-cyl® - Tropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Muco-cyl® - Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Muco-cyl® - Tropfen beachten?
3. Wie sind Muco-cyl® - Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Muco-cyl® - Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Muco-cyl® - Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Muco-cyl® - Tropfen sind ein homöopathisches Arzneimittel. Die Homöopathie versteht sich als Regulations-therapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: katarrhalische Erkrankungen der oberen Luftwege und der Ohren sowie der Schleimhäute des Magen-Darm-Kanals.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Muco-cyl® - Tropfen sind ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt: Allium cepa, Ammonium chloratum, Eupatorium perfoliatum, Fagopyrum esculentum,

Kalium bichromicum, Hydrargyrum sulfuratum rubrum, Natrium chloratum, Thuja occidentalis.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Muco-cyl® - Tropfen beachten?

Muco-cyl® - Tropfen dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe, insbesondere gegen Chrom, oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Muco-cyl® - Tropfen ist erforderlich, wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt und die Beschwerden weiter fortbestehen, dann ist eine ärztliche Beratung erforderlich.

Dieses Arzneimittel enthält pro Einzeldosis (7 - 15 Tropfen) 99 - 213 mg Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose in geringsten Mengen. Bitte nehmen Sie Muco-cyl® - Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerverträglichkeit leiden.

Kinder:

Die Anwendung von Muco-cyl® - Tropfen bei Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Zu Beginn der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln kann es zu einer vorübergehenden Verschlimmerungen der bestehenden Beschwerden kommen (Erstverschlimmerung).

In einem solchen Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Bei Einnahme von Muco-cyl® - Tropfen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft

und Stillzeit liegen nicht vor.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Muco-cyl® - Tropfen haben keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von 36,9 Gew.-%.

3. Wie sind Muco-cyl® - Tropfen einzunehmen?

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 2 - 3 mal täglich 7 - 15 Tropfen.

In akuten Fällen kann die Einnahmehäufigkeit auf 5 - 10 Tropfen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, erhöht werden.

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser (1/2 Teelöffel) einnehmen und einige Zeit im Mund belassen. Die Einnahme sollte unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb einer Woche keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Anwendung von Muco-cyl® - Tropfen bei Kindern unter 6 Jahren wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Wenn Sie eine größere Menge Muco-cyl® - Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten:

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Muco-cyl® - Tropfen vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Muco-cyl® - Tropfen Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Anwendung kann erneut Speichelfluß auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Nach Anwendung können Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind Muco-cyl® - Tropfen aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder lagern (Fernseher, Computerbildschirme, Mikrowellenherde).

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. Weitere Informationen

Was Muco-cyl® - Tropfen enthalten:

Die Wirkstoffe sind:

1 g (= 26 Tropfen = 1,06 ml) enthält 0,125 g Allium cepa Dil. D6, 0,125 g Ammonium chloratum Dil. D3, 0,125 g Eupatorium perfoliatum Dil. D4, 0,125 g Fagopyrum esculentum Dil. D3, 0,125 g Kalium bichromicum Dil. D4, 0,125 g Hydrargyrum sulfuratatum rubrum Dil. D8, 0,125 g Natrium chloratum Dil. D8, 0,125 g Thuja occidentalis Dil. D6.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol, gereinigtes Wasser (Gesamthethanolgehalt 36,9 Gew.-%); Lactose in geringsten Mengen.

Wie Muco-cyl® - Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:

Leicht gelbliche, nahezu klare Lösung in braunen Glasflaschen mit Schraubverschluss und Tropfeinsatz. Packungsgröße: 30 ml

Trübungen sind ohne Einfluss auf die Wirksamkeit.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller



Pharma Liebermann GmbH
Hauptstr. 27
D-89423 Gundelfingen
Tel.: 0049-9073-958930
Fax.: 0049-9073-9589355
E-Mail: info@pharma-liebermann.de

Z.Nr.: 3-00398

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Mai 2010