

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Spenglersan Kolloid T – Lösung zur äußerlichen Anwendung

Antigene aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9, Antigene aus Mycobacterium bovis Dil. D9, Antigene aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9, Antigene aus Neisseria mucosa Dil. D9, Antitoxine aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9, Antitoxine aus Mycobacterium bovis Dil. D9, Antitoxine aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9, Antitoxine aus Neisseria mucosa Dil. D9

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Spenglersan Kolloid T jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Spenglersan Kolloid T und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid T beachten?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid T anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid T aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Spenglersan Kolloid T und wofür wird es angewendet?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

Leichte Formen von Asthma, Ekzeme, Rheuma, Migräne .

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid T beachten? Wann darf Spenglersan Kolloid T nicht angewendet werden?

Spenglersan Kolloid T Lösung zur äußerlichen Anwendung darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen Antigene aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9, Antigene aus

Mycobacterium bovis Dil. D9, Antigene aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9, Antigene aus Neisseria mucosa Dil. D9, Antitoxine aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9, Antitoxine aus Mycobacterium bovis Dil. D9, Antitoxine aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9, Antitoxine aus Neisseria mucosa Dil. D9 oder einen der sonstigen Bestandteile angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spenglersan Kolloid T ist erforderlich

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist die Anwendung des Arzneimittels abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl, ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Anwendung von Spenglersan Kolloid T mit anderen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Spenglersan Kolloid T hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Spenglersan Kolloid T anzuwenden?

Wenden Sie Spenglersan Kolloid T immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Dosierung:

Erwachsene: 3 x täglich 5-10 Sprühstöße;

Mit 1 x täglich 5 Sprühstößen beginnen, maximal jedoch 30 Sprühstöße täglich.
Individuelle Reaktionen müssen beachtet werden, um die Dosis anzupassen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen werden.

Art der Anwendung:

Auf die Innenseite des Ellenbogens aufsprühen und einreiben.
Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Bei Anwendung mehrerer Spenglersan Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden.

Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage andauern, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid T angewendet haben als Sie sollten

Es ist nicht mit unerwünschten Auswirkungen zu rechnen.

Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid T vergessen haben

Wiederholen Sie diese Anwendung nicht, sondern fahren Sie mit der nächsten Einreibung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. Wie ist Spenglersan Kolloid T aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern. Vor starker Sonnenbestrahlung und starken elektromagnetischen Feldern (z.B.: Mikrowelle, Bildschirme) geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. Weitere Informationen

Was Spenglersan Kolloid T enthalten:

100 g Spenglersan Kolloid T enthalten:

Wirkstoffe:

Antigene aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9	10 g
Antigene aus Mycobacterium bovis Dil. D9	20 g
Antigene aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9	10 g
Antigene aus Neisseria mucosa Dil. D9	10 g
Antitoxine aus Mycobacterium tuberculosis Dil. D9	10 g
Antitoxine aus Mycobacterium bovis Dil. D9	20 g
Antitoxine aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9	10 g
Antitoxine aus Neisseria mucosa Dil. D9	10 g
gemeinsam potenziert über 8 Stufen	

Die sonstigen Bestandteile sind:

Thymol, Zuckersirup Salzsäure 25% ethanolhaltige Jodlösung und gereinigtes Wasser.

1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen

Wie Spenglersan Kolloid T aussieht und Inhalt der Packung

Braunglasflasche mit Pumpe und Sprühkopf.

Packungsgrößen: 10 (20, 50, 100) ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Meckel-Spenglersan GmbH, Steinfeldweg 13, D-77815 Bühl, Deutschland

Tel.: 0049722330671, Fax: 00497223/8713

Zulassungsnummer: 3-00165

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September 2011.