

## GEBRAUCHSINFORMATION

ALGESAL - Creme

Wirkstoff: Diethylaminsalicylat und Myrtecin

Z.Nr.: 1-21187

### ZUSAMMENSETZUNG:

Was enthält Algesal - Creme?

100 g Creme enthalten:

10 g Diethylaminsalicylat, 1 g Myrtecin sowie Macrogolglycerolricinoleat, Ethylenglykolmonopalmitostearat, Glycerolmonostearat 40-55, Cetylstearylalkohol, konzentrierte Salzsäure, Macrogolstearat 300, dünnflüssiges Paraffin, Macrogolglycerollinoleat, Lavendelaroma, gereinigtes Wasser.

### ARZNEIFORM:

Öl/Wasser-Emulsion

### PACKUNGSGRÖSSEN:

Welche Packungsgrößen stehen Ihnen zur Verfügung ?

Tube zu 50 g und 100 g

### PHARMAZEUTISCH-THERAPEUTISCHE KATEGORIE UND WIRKUNGSWEISE:

Wie wirkt Algesal - Creme ?

Der Wirkstoff Diethylaminsalicylat ist ein Salz der Salicylsäure mit schmerzstillender und entzündungshemmender Wirkung.

Myrtecin setzt die Empfindlichkeit der Haut gegen Schmerzreize herab und entspannt die Muskulatur.

Algesal - Creme ist ein äußerlich anwendbares Mittel, welches von der gesunden Haut gut vertragen wird. Sie hat einen angenehmen Geruch (Lavendel) und fettet nicht.

### ZULASSUNGSINHABER:

SOLVAY PHARMA Ges.m.b.H., 3400 Klosterneuburg

### HERSTELLER:

SOLVAY PHARMACEUTICALS S.A.S, Suresnes, Frankreich

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Wann wird Algesal - Creme angewendet ?

Zur örtlichen Behandlung von:

- Muskelschmerzen (Muskelkater), Gelenk-, Sehnen- und Nerven-schmerzen
- Schmerzen im Bereich von Schulter, Arm und Wirbelsäu-le, Hexenschuss
- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Ergüssen.

## GEGENANZEIGEN:

Wann darf diese Creme nicht angewendet werden ?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe oder gegen andere Rheumamittel.

Bei ekzematisch oder entzündlich veränderter Haut.

Bei Säuglingen und Kleinkindern bis 30 Monaten oder bei Kindern, die bereits einmal Krampfanfälle (Fieberkrämpfe oder andere Krampferkrankungen) erlitten haben, nicht anwenden.

Schwangerschaft und Stillperiode:

Darf Algesal - Creme während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden ?

Algesal – Creme sollte in der Schwangerschaft, insbesondere in den letzten drei Monaten nicht angewendet werden. Sie müssen Ihren Arzt informieren, wenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu sein. Ihr Arzt wird dann über eine Anwendung entscheiden.

In der Stillzeit darf Algesal – Creme nicht angewendet werden.

## BESONDERE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN

### ANWENDUNG:

Was ist noch zu beachten ?

Erste Anzeichen von Nebenwirkungen oder der Eintritt einer Schwanger-schaft sind Ihrem Arzt zu melden.

Nicht mit Augen, Schleimhäuten oder geschädigten Hautpartien in Berührung bringen.

Algesal – Creme enthält als Hilfsstoff Lavendelaroma mit geringen Konzentrationen an Terpenderivaten, wie z.B. Campher; daher wird die Anwendung bei Kindern unter 7 Jahren generell nicht empfohlen bzw. ist besondere Vorsicht geboten. Terpenderivate können die Krampfschwelle erniedrigen und in sehr hohen Dosen zu neurologischen Nebenwirkungen, wie z.B. Krampfanfällen bei Kindern führen. Die empfohlene Dosis sollte unbedingt eingehalten werden, insbesondere sollte eine großflächige Anwendung vermieden werden. Auch bei erwachsenen Patienten mit Krampferkrankungen in der Vorgeschichte ist ebenso besondere Vorsicht geboten.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung von Algesal - Creme nicht eintritt, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf.

Bewahren Sie Algesal - Creme immer außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern auf!

#### WECHSELWIRKUNGEN:

Darf Algesal - Creme gleichzeitig mit anderen Medikamenten angewendet werden ?

Bei wiederholter großflächiger Anwendung sind Wechselwirkungen mit gleichzeitig eingenommenen Medikamenten zur Hemmung der Blutgerinnung, zur Senkung des Blutzuckers, zur Förderung der Harnausscheidung oder mit anderen Rheumamitteln möglich.

Informieren Sie daher Ihren Arzt (Facharzt), wenn Sie eines dieser Mittel einnehmen.

#### ART DER ANWENDUNG UND DOSIERUNG:

Wie oft sollen Sie die Creme anwenden ?

Falls nicht anders verordnet, tragen Sie die Creme bis zu 3 x täglich dünn auf die schmerzende Stelle auf.

Wie wird die Creme angewendet?

Sie massieren die Creme leicht ein, bis sie von der Haut aufgenommen ist. Sie dürfen die Creme nur äußerlich anwenden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Creme nicht mit Ihren Augen, Schleimhäuten oder geschädigten Hautstellen in Berührung bringen. Nach der Anwendung die Hände gründlich waschen.

Ein Salbenverband ist nicht zweckmäßig. Wenn Sie einen Schutz- oder Stützverband anlegen wollen, warten Sie ab, bis die Creme von der Haut aufgenommen ist.

#### NEBENWIRKUNGEN:

Welche unerwünschten Wirkungen können auftreten ?

Wie alle Arzneimittel kann Algesal - Creme neben den erwünschten auch unerwünschte Wirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten vorkommen müssen.

In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, wie Rötung, Juckreiz oder Hautausschlag kommen.

Im Allgemeinen sind bei Einhaltung der Dosierung andere Nebenwirkungen, wie sie bei Einnahme von Rheumamitteln auftreten können, nicht zu erwarten.

Bei wiederholter Anwendung auf großen Flächen (über ca. 20 g täglich) sind Nebenwirkungen, wie Übelkeit oder Reizungen der Magenschleimhaut nicht mit Sicherheit auszuschließen.

Ein bestehendes Asthma kann bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate verschlechtert werden.

Generell besteht bei Präparaten, die Terpenderivate wie z.B. Campher enthalten, ein Risiko für Krampferkrankungen bei Kindern, und wenn die empfohlenen Dosen nicht eingehalten werden, können Erregheitszustände und Verwirrtheit bei älteren Patienten auftreten. Bei Algesal – Creme ist die Konzentration an Terpenderivaten jedoch sehr gering und Nebenwirkungen solcherart sind bislang nicht bekannt geworden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie über diese Nebenwirkungen beunruhigt sind oder andere Beschwerden haben.

**HINWEIS AUF VERFALLDATUM UND LAGERUNG:**

Verwenden Sie Algesal - Creme nur bis zum angegebenen Ablaufdatum. Sie finden es auf der Außenverpackung und auf der Tube. Restmengen können Sie in die Apotheke zurückbringen.

Lagerungshinweise:

Nicht über Raumtemperatur (bis 25°C) lagern.

Stand der Gebrauchsinformation: März 2004

Wenn Sie weitere Fragen zu Algesal - Creme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.