

Gebrauchsanweisung

AlleNasal® Protect – Nasenspray 15 ml – (ca. 125 Sprühstöße)

INDIKATION: Flüssiger Schutzfilm zur symptomatischen Behandlung von allergischem Schnupfen (verschiedenen Ursprungs).

DARREICHUNGSFORM: Spray 15 ml (ca. 125 Sprühstöße)

ZUSAMMENSETZUNG: Wasser, Glycerol (2%), Akazien- und Xanthangummi, Allercyanidin-G (Derivat aus Extrakten von *Camellia sinensis*-Blättern, *Curcuma longa*-, *Panax ginseng*- und *Urtica dioica*-Wurzeln), ätherisches Öl aus *Citrus limonum*, Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Zitronensäure).


WIRKMECHANISMUS:

Beim Aufsprühen auf die Nasenschleimhaut bildet AlleNasal® Protect einen leicht osmotischen, widerstandsfähigen, flexiblen absorbierenden Barrierefilm auf der Nasenschleimhaut. Der Film wirkt als Schutzbarriere gegen Umweltallergene und andere Reiz- und Schadstoffe und verhindert, dass sie mit der Nasenschleimhaut in Kontakt kommen. Der positive osmotische Druck des Films zieht die auf der Nasenschleimhaut vorhandenen Schadstoffe an und bindet sie. Diese Reinigungswirkung fördert die Reparatur der Schleimhaut und stärkt ihre Abwehrkräfte. Eine intakte Nasenschleimhaut verhindert das Eindringen von Allergenen in den Körper. So bewirkt diese absorbierende mechanische Barriere, die zugleich schützt, reinigt und den Allergenkontakt minimiert, eine rasche Symptomlinderung. AlleNasal® Protect ist reizarm und wirkt mechanisch auf die Nasenschleimhaut, ohne vom Körper aufgenommen zu werden. Die klinischen Ergebnisse belegen eine signifikante Verringerung der Reizung und Nasenverstopfung sowie eine sehr schnelle Normalisierung des Nasenausflusses.

AlleNasal® Protect kann vorbeugend vor dem erwarteten Kontakt (ca. 5–15 Minuten vorher als präventive Maßnahme) oder nach Beginn einer Reaktion angewendet werden.

ANWENDUNG:

1. Reinigen Sie Ihre Nase gründlich, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Schütteln Sie das Fläschchen.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe.
4. Vor der ersten Anwendung betätigen Sie den Zerstäuber, bis ein feiner Sprühnebel entsteht.
5. Führen Sie den Sprühaufsatz senkrecht in ein Nasenloch ein, halten Sie sich das andere Nasenloch mit einem Finger zu und zerstäuben Sie das Produkt, indem Sie den Sprühkopf betätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim anderen Nasenloch.
6. Reinigen Sie den Sprühaufsatz nach jeder Anwendung. Setzen Sie die Schutzkappe nach jeder Anwendung wieder auf.



SYMPTOMATISCHE BEHANDLUNG: Wenn eine allergische Reaktion auftritt, geben Sie in jedes Nasenloch 2–3 Sprühstöße und atmen Sie dabei leicht ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang 3- bis 4-mal am Tag.

VORBEUGENDE BEHANDLUNG: Wenn Ihre Allergiesymptome abgeklungen sind, Sie jedoch weiterhin mit dem Allergen/Reizstoff in Kontakt kommen, können Sie dieses Produkt vorbeugend anwenden. Geben Sie in jedes Nasenloch 2–3 Sprühstöße, am besten 5–15 Minuten vor dem Kontakt mit der allergenen Substanz oder vor Betreten einer belasteten/allergieauslösenden Umgebung. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2- bis 3-mal am Tag.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen und Anwendungshinweise beachten. Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung in der Nasenhöhle bestimmt. Vor Gebrauch Hände waschen. Um das Risiko einer Kreuzinfektion zu verringern, darf jedes Fläschchen nur von einer Person verwendet werden. Die Wirkungsweise des Produkts trägt zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Nasenschleimhaut bei. Aus diesem Grund sollte die Behandlung mit diesem Produkt 3 Wochen nicht überschreiten. Falls die Symptome 5 Tage nach dem Behandlungsabbruch erneut auftreten, kann die Behandlung gemäss den Anwendungsempfehlungen in dieser Gebrauchsanweisung wiederholt werden.

Sollte nach 7-tägiger Behandlung keine Besserung und/oder eine Verschlimmerung der Symptome und/oder begleitendes Fieber auftreten, fragen Sie Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin um Rat oder wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin. Das Produkt darf nicht nach dem Verfallsdatum, 30 Tage nach der ersten Anwendung sowie bei beschädigtem Behältnis verwendet werden. AlleNasal® Protect ist beim Verschlucken nicht giftig. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen.

AUFBEWAHRUNG:

Bei Raumtemperatur lagern. Nicht im Kühlschrank lagern und nicht einfrieren.

INTERAKTIONEN: Aufgrund der Zusammensetzung und des mechanisch-topischen Wirkungsmechanismus ist die Wahrscheinlichkeit von Interaktionen mit einer systemischen Behandlung äußerst gering. Aus Gründen der Wirksamkeit, 15 Minuten vor und nach Gebrauch des Produkts keine andere nasal-topischen Therapien anwenden.

KONTRAINDIKATIONEN: Prüfen Sie die Zusammensetzung des Produkts, und wenden Sie es nicht an, wenn Sie empfindlich oder allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren. Obwohl alle Inhaltsstoffe, die zur Herstellung dieses Produkts verwendet werden, aus Lebensmittelzutaten stammen und in sehr geringen Mengen verwendet werden, ist das Produkt in der Schwangerschaft und Stillzeit ohne ärztlichen Rat nicht anzuwenden, da keine ausreichenden Daten zur Sicherheit vorliegen. Auch bei Kindern unter 12 Jahren sowie bei Patienten mit Asthma oder ausgeprägten Atembeschwerden wird die Anwendung nicht empfohlen.

NEBENWIRKUNGEN:

Wenn bei Ihnen innerhalb weniger Minuten nach Anwendung des Produkts eine allergische Reaktion (z.B. starke, anhaltende Reizung/ Brennen) auftritt, brechen Sie die Anwendung des Produkts ab, spülen Sie die Nase gründlich mit frischem, klarem Wasser und wenden Sie sich gegebenenfalls an medizinisches Fachpersonal. Wenn Sie einen schwerwiegenden Zwischenfall im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produkts bemerken, benachrichtigen Sie bitte sofort den Hersteller/Vertrieb sowie das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen.

Die Verpackung (einschließlich Behälter) kann nach Gebrauch im Haushaltsabfall entsorgt werden.

HERSTELLER

VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, Frankreich

HERGESTELLT in Frankreich

VERTRIEB

Opella Healthcare Austria GmbH
Turm A, 29. OG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Österreich
www.sanofi.at



Medizinprodukt

Version der Gebrauchsanweisung: AAG b9-0621