

**Liebe Patientin, lieber Patient!**

06G002349IN R

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**GEBRAUCHSINFORMATION****ESSEX® Basiscreme****Zusammensetzung**

1 g Creme enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge:

Weißes Vaseline	150	mg
Dickflüssiges Paraffin	60	mg
Cetylstearylalkohol	72	mg
Cetomacrogol 1000	22,5	mg
Natriumdihydrogenphosphat 2H ₂ O	3	mg
Phosphorsäure 85%	0,02	mg
Chlorocresol	1	mg
Gereinigtes Wasser	691,48	mg

Sonstige Bestandteile:

Keine

Darreichungsform und Inhalt

Creme, 50 g

Zur Anwendung auf der Haut.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Arzneimittel für die Haut. Kortikoidfreie Grundlage von Diprosone® Creme.

Pharmazeutischer Unternehmer:

essex pharma GmbH
Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
Deutschland

Telefon: 0049/89/62731-0
Telefax: 0049/89/62731-499
info@essex-pharma.de

Hersteller:

SP Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgien

Telefon: 0032/15/25-8711
Telefax: 0032/15/25-8880

Anwendungsgebiete

Anwendung im Rahmen einer Intervallbehandlung bei Hauterkrankungen, die mit kortikoidhaltigen Salben oder Cremes behandelt werden, wie z.B. Ekzeme, Hautentzündungen. ESSEX® Basiscreme eignet sich besonders für die Behandlung akuter nässender Hauterkrankungen.

Gegenanzeigen**Wann dürfen Sie ESSEX® Basiscreme nicht anwenden?**

Sie dürfen ESSEX® Basiscreme nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Chlorocresol und Cetylstearylalkohol oder gegenüber einem anderen Bestandteil von ESSEX® Basiscreme sind. ESSEX® Basiscreme darf nicht auf Schleimhäuten und Augen angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Entfällt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bei der Behandlung mit ESSEX® Basiscreme im Genital- oder Analbereich kann es wegen der Hilfsstoffe weißes Vaseline und dickflüssiges Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Warnhinweise

Keine

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ESSEX® Basiscreme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da ESSEX® Basiscreme sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von ESSEX® Basiscreme und wie oft sollten Sie ESSEX® Basiscreme anwenden?

ESSEX® Basiscreme wird 1-3x täglich angewendet.

ESSEX® Basiscreme wird dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und leicht eingerieben.

Wann sollten Sie ESSEX® Basiscreme anwenden?

Die Häufigkeit der Anwendung im Wechsel mit der kortikoidhaltigen Zubereitung bestimmt der Arzt.

Wie lange sollten Sie ESSEX® Basiscreme anwenden?

Die Dauer der Anwendung hängt vom Behandlungsfortschritt ab und kann 1 - 3 Wochen betragen.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben?

Holen Sie die vergessene Anwendung sobald wie möglich nach und halten Sie dann wieder Ihren gewohnten Anwenderhythmus ein.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ESSEX® Basiscreme auftreten?

In sehr seltenen Fällen kann es zu Nebenwirkungen kommen wie z.B. Brennen beim Auftragen auf die Haut.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Tube und Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist ESSEX® Basiscreme 4 Wochen haltbar und sollte anschließend verworfen werden.

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information

August 2004

ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!

essex pharma GmbH
Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
www.essex.de



The logo for Essex Pharma features a stylized 'sp' monogram above the words 'essex pharma' in a lowercase, sans-serif font. A horizontal line is positioned above the text.