Dr. R. Pfleger

Gebrauchsinformation

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Biofanal® 100 000 I.E. Vaginaltabletten

Wirkstoff: Nystatin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Biofanal®, Vaginaltabletten, jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 bzw. 6 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Biofanal®, Vaginaltabletten, und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Biofanal®, Vaginaltabletten, beachten?
3. Wie sind Biofanal®, Vaginaltabletten, anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Biofanal®, Vaginaltabletten, aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Biofanal, Vaginaltabletten, und wofür werden sie angewendet?

Biofanal, Vaginaltabletten, sind ein spezifisch gegen Hefepilze (Candida albicans und andere Candida-Arten) wirkendes Mittel zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Scheide.
Biofanal, Vaginaltabletten, werden angewendet zur Behandlung von Infektionen der Scheide, die durch Nystatin-empfindliche Hefepilze (Candida albicans, Candida glabrata u.a.) hervorgerufen worden sind (Fluor, Vaginitis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, beachten?

Biofanal, Vaginaltabletten, dürfen nicht angewendet werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile von Biofanal, Vaginaltabletten, sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, ist erforderlich

Kinder
Aufgrund der hohen Osmolarität von Nystatin wird von einer Anwendung bei sehr untergewichtigen und unreifen Frühgeborenen abgeraten.

Worauf müssen Sie noch achten?
Aufgrund des in den Biofanal, Vaginaltabletten, enthaltenen Wirkstoffs Nystatin sind gelbliche Verfärbungen der Unterwäsche möglich. Diese lassen sich durch normales Waschen wieder entfernen.

Bei Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Biofanal, Vaginaltabletten, oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Biofanal, Vaginaltabletten, beeinflusst?
Keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Nystatin, der Wirkstoff in Biofanal, Vaginaltabletten, wird in therapeutischer Dosis nach oraler Gabe, über die intakte Haut oder über die Schleimhäute kaum resorbiert. Nystatin passiert die Plazentaschranke nicht, und ein Übertritt in die Muttermilch ist ebenfalls nicht zu erwarten.
Biofanal, Vaginaltabletten, können während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Biofanal, Vaginaltabletten
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte wenden Sie Biofanal, Vaginaltabletten, daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie sind Biofanal, Vaginaltabletten, anzuwenden?

Wenden Sie Biofanal, Vaginaltabletten, immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Kurzzeittherapie:
An 3 aufeinander folgenden Tagen sind vor dem Schlafengehen 2 Vaginaltabletten tief in die Scheide einzuführen.

6 Tage-Therapie:
An 6 aufeinander folgenden Tagen ist vor dem Schlafengehen eine Vaginaltablette tief in die Scheide einzuführen.

Durch eine ärztliche Nachuntersuchung sollte geklärt werden, ob die Behandlung erfolgreich verlaufen oder fortzusetzen ist. In letzterem Fall kann die Behandlung bis zur endgültigen Heilung verlängert werden.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Biofanal, Vaginaltabletten, zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Biofanal, Vaginaltabletten, angewendet haben, als Sie sollten:
Vergiftungserscheinungen sind auch bei Überdosierung von Biofanal, Vaginaltabletten, kaum zu erwarten, da der in Biofanal, Vaginaltabletten, enthaltene Wirkstoff Nystatin bei vaginaler Anwendung nur in geringen Mengen in die Blutbahn übergeht. Verständigen Sie bei Verdacht auf eine Überdosierung bitte auf jeden Fall einen Arzt!

Wenn Sie die Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, vergessen haben:
Sie sollten die Behandlung am nächsten Tag fortsetzen und die Behandlungsdauer entsprechend um einen Tag verlängern.

Wenn Sie die Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, abbrechen:
Zur Erzielung des erwünschten Therapieerfolges halten Sie sich bitte an die im Abschnitt **„Wie sind Biofanal, Vaginaltabletten, anzuwenden?"** empfohlene Behandlungsdauer oder an die ärztlich verordnete Anwendungsvorschrift. Die Behandlung sollte nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt unterbrochen oder vorzeitig beendet werden.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Biofanal, Vaginaltabletten, Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bei überempfindlichen Patientinnen können gelegentlich (weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten) Brennen und Juckreiz auftreten. In diesen Fällen ist der Arzt zu unterrichten.
Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte die Behandlung abgebrochen werden.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind Biofanal, Vaginaltabletten, aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
Nicht über 25 °C aufbewahren.
Arzneimittel sollten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was eine Tablette Biofanal, Vaginaltabletten, enthält:
Der Wirkstoff ist: 100 000 I.E. Nystatin.
Die sonstigen Bestandteile sind: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke.

Wie Biofanal, Vaginaltabletten, aussehen und Inhalt der Packung:
Gelbe, ovale, biplane Tabletten; Packungen mit 6 und 12 Vaginaltabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer

Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, D-96045 Bamberg, Telefon: 0951/60 43-0, Telefax: 0951/60 43 29.
E-Mail: info@dr-pfleger.de *Internet: www.dr-pfleger.de*

Stand der Information

Dezember 2006

Patienteninformation zu Biofanal®, Vaginaltabletten

Liebe Patientin,

mit Biofanal, Vaginaltabletten, haben Sie ein Pfleger-Arzneimittel erhalten, das Ihnen helfen wird, Ihre Hefepilz-Infektion der Scheide wirksam zu behandeln. Halten Sie sich bitte an die empfohlene Dosierung, damit Biofanal, Vaginaltabletten, ihre volle Wirksamkeit entfalten können.

Nystatin ist ein biologischer Wirkstoff, der spezifisch gegen Hefepilze (Candida albicans und andere Candida-Arten) wirkt. Er ist zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Haut, der Vaginalschleimhaut und des Magen-Darm-Kanals geeignet.

Da Nystatin bei vaginaler Anwendung praktisch nicht in die Blutbahn übergeht, ist die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit möglich. Bei der Behandlung von Pilzinfektionen müssen sämtliche Pilzherde auf der Haut und der Vaginalschleimhaut beseitigt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Anwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, der Sie entsprechend beraten wird.

Ihre Dr. R. Pfleger GmbH wünscht Ihnen gute Besserung.

Biofanal® 100 000 I.E. Vaginaltabletten

Hefepilzspezifisches Antimykotikum

202030
002
pal-055-20061205

Dr. R. Pfleger

Gebrauchsinformation