



Erste Abwehr

Bekämpft Erkältungserreger von Anfang an

Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Falls Sie Fragen haben oder Ihnen etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wann sollte ich WICK Erste Abwehr verwenden?

Beginnen Sie mit der Anwendung sofort bei den ersten Anzeichen einer Erkältung, noch bevor sie richtig ausgebrochen ist (z.B. „Kratzen“ im Nasen-Rachenraum). Sie können mit der Anwendung auch beginnen, wenn sie das Gefühl haben, einem Erkältungsrisiko ausgesetzt zu sein: Anwendung bis zu 4 Tage - falls Symptome auftreten sollten, kann die Anwendung bis zum Abklingen der Symptome erfolgen.

Wie wirkt WICK Erste Abwehr?



WICK Erste Abwehr Mikro-Gel Spray wirkt genau dort im Nasen-Rachen-Raum, wo sich die Erkältungserreger zuerst einnisten und vermehren.

Das im Spray enthaltene Mikro-Gel kapselt Erkältungserreger ein und hilft Ihrem Körper, sie zu beseitigen.

Was ist vor dem Gebrauch zu beachten?

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der unten gelisteten Inhaltsstoffe.

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, befragen Sie Ihren Arzt falls:

- Sie schwanger sind oder stillen
- Sie eine empfindliche Nasen-, Rachen- oder Mittelohrschleimhaut haben
- Sie zu Nasenbluten neigen. Eine Erkältung kann diese Neigung verstärken und gelegentlich Nasenbluten auslösen, da die Infektion die Nasenschleimhäute reizt.

Wie wende ich das Produkt an?

Vor dem ersten Gebrauch Schutzkappe von der Sprühöffnung entfernen und die Pumpe mehrmals kräftig betätigen (in ein Papiertuch sprühen).

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:

Zum Sprühen den Flaschenboden mit dem Daumen und den Sprühaufsatz zwischen Zeige- und Mittelfinger halten. Ohne den Kopf nach hinten zu beugen, die Sprühöffnung in das rechte Nasenloch halten und in Richtung des rechten Ohres sprühen. Dazu 2 bis 3 mal die Spray-Pumpe kräftig, gleichmäßig und vollständig herunterdrücken. Dabei normal weiteratmen.

Dann, ohne den Kopf nach hinten zu beugen, die Sprühöffnung in das linke Nasenloch halten und in Richtung des linken Ohres sprühen. Dazu erneut die Spray-Pumpe 2 bis 3 mal kräftig, gleichmäßig und vollständig herunterdrücken und dabei normal weiteratmen.

Sprühöffnung nach dem Benutzen sauber wischen und Schutzkappe wieder aufsetzen.

Bei Nichtgebrauch über mehr als eine Woche vor Gebrauch erneut zuerst in ein Papiertuch sprühen.

Für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

Zwischen den Anwendungen 4 Stunden Abstand halten. Nicht öfter als 4 mal pro Tag anwenden.

Erkältungssymptome dauern normalerweise 7 bis 14 Tage an. Sollten Sie länger anhaltende Symptome haben, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Um die besten Erfolge zu erzielen, nach Abklingen der Beschwerden noch weitere 48 Stunden lang anwenden. Nur entsprechend der Gebrauchsanleitung anwenden.

Flasche nicht bei mehreren Personen anwenden; dies könnte zu einer Weiterverbreitung der Infektion führen. Nur zur Anwendung in der Nase. Verwenden Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis.



205



Was ist während bzw. nach dem Gebrauch des Produktes zu beachten?

Nurübergehend können wie bei Nasensprays oder Nasenspülungen Brennen, Stechen, Niesreiz oder verstärktes Nasenlaufen auftreten. Dies zeigt an, dass das Produkt wirkt. Diese Anzeichen sind unbedenklich und halten nicht lange an. Falls solche Effekte doch anhalten, beenden Sie den Gebrauch des Produktes.

Wie andere Produkte zur Anwendung in der Nase kann WICK Erste Abwehr die Nasenschleimhaut reizen, was unter Umständen zu Nasenbluten führen kann. Dies tritt selten auf, ist üblicherweise nicht stark ausgeprägt und von kurzer Dauer. Falls während einer Erkältung Nasenbluten auftritt, benutzen Sie Wick Erste Abwehr nicht. Falls bei oder nach Gebrauch des Produktes Nasenbluten auftreten sollte, beenden Sie den Gebrauch. Falls Nasenbluten sehr stark ausgeprägt ist oder länger anhält, befragen Sie Ihren Arzt.

In einigen Fällen wurde von vorübergehenden Kopfschmerzen, Schmerzen in Nase, Augen und Hals berichtet; diese Symptome klingen bei Absetzen des Produktes ab.

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn bei Ihnen eine allergische Reaktion oder Nebenwirkungen auftreten und wenden Sie sich an einen Arzt oder Apotheker.

Bitte befragen Sie Ihren Arzt auch, falls:

- die Erkältung nach 7-14 Tagen noch nicht abgeklungen ist
- die Beschwerden schlimmer werden oder mit Fieber einhergehen.

Bei versehentlichem Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend ärztlichen Rat einholen. Brechen Sie die Anwendung umgehend ab, wenn eine allergische Reaktion auftritt und kontaktieren Sie medizinisches Fachpersonal.

Wie ist WICK Erste Abwehr aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern. Stehend aufbewahren. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Nach Ablauf des Verfalldatums auf Umkarton/ Flasche nicht mehr anwenden.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Möglicherweise möchten Sie diese Packungsbeilage später nochmals lesen. Bewahren Sie sie deshalb gut erreichbar auf, bis Sie dieses Produkt aufgebraucht haben.

Bestandteile:

Wasser, Hydroxypropylmethylcellulose (basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen), Bernsteinsäure, Dinatriumsuccinat, Pyroglutaminsäure, Phenylethylalkohol, Zink EDTA, Zinkacetat, Polysorbat 80, Aroma: (Menthol, Kampfer, Eucalyptol), Saccharin-Natrium.

Hersteller:

Procter & Gamble Technical Centres Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XP,
Vereinigtes Königreich

Schwalbach General Office & Technical Centre
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach Am Taunus, Deutschland

Kontaktadresse:

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH D-65823
Schwalbach/Ts.

☎ Tel.: 0800-9425847

Flasche mit 15 ml

Spray zur
Nasenspülung

Stand der Information: Februar 2021

90006419



PAW2960