Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

PANTEDERM® N HEXAL®

Salbe

Wirkstoff: Zinkoxid

Zusammensetzung
Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 g Salbe enthält 100 mg Zinkoxid.

Sonstige Bestandteile: Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), weißes Vaselin, Wollwachsalkohole

Darreichungsform und Inhalt
Originalpackungen mit 35 g (N1) und 100 g (N2) Salbe

Wund- und Heilsalbe

HEXAL AG
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0
Fax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller
Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete
Zur Unterstützung einer Therapie bei subakuten und chronischen Ekzemen, Wundsein der Haut durch Scheuern oder Feuchtigkeit, Windeldermatitis und Fissuren (Hautrisse).

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie PANTEDERM® N HEXAL® nicht anwenden?
PANTEDERM® N HEXAL® soll nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Wollwachsalkoholen oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels angewendet werden.

Wechselwirkungen
Welche Wechselwirkungen zwischen PANTEDERM® N HEXAL® und anderen Arzneimitteln sind zu beachten?
Vor der Anwendung anderer, auf der Haut aufzutragender Mittel (z. B. Salben oder Cremes) ist PANTEDERM® N HEXAL® vollständig zu entfernen, da diese sonst nur eingeschänkt wirksam sind.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt PANTEDERM® N HEXAL® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da PANTEDERM® N HEXAL® sonst nicht richtig wirken kann.

Wie und wie oft sollten Sie PANTEDERM® N HEXAL anwenden?
PANTEDERM® N HEXAL® wird mehrmals täglich oder bei jedem Verbandswechsel ausreichend flächendeckend aufgetragen.

Bei Salbenverbänden sollten Sie die Wunde sorgfältig und schonend desinfizieren, ausreichend Salbe auf eine Kompresse auftragen und auf die erkrankte Hautpartie legen. Erneuern Sie den Verband nach Anweisung des Arztes, im Allgemeinen alle 24 Stunden.

Beim erstmaligen Öffnen der Tube, Verschlusskappe aufdrehen und mit der Spitze die Schutzmembran eindrücken.

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von PANTEDERM® N HEXAL® auftreten?
Nach Auftragen von PANTEDERM® N HEXAL® auf stark entzündete Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels
Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist PANTEDERM® N HEXAL® aufzubewahren?
Bewahren Sie die Tube fest verschlossen auf.

Stand der Information
März 2004

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!
Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

575440