

## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Formica und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Formica beachten?
3. Wie ist Formica einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Formica

## Urtinktur und Flüssige Verdünnungen



WELEDA

### 1. Was ist Formica und wofür wird es angewendet?

Formica ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Anregung und Strukturierung von Stoffwechselprozessen bei gesteigerter Ablagerungs- und Verhärtungstendenz, z.B. chronisch-rheumatische Erkrankungen, Gicht, Arthrose, Muskelverhärtungen (Myogelosen), Neuralgien, Ekzeme.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Formica beachten?

**Formica Ø bis einschließlich D6 darf nicht angewendet werden,**

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ameisensäure sind.

Für Formica D12 sind keine Gegenanzeigen bekannt.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### Kinder

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollen bei Säuglingen im 1. Lebensjahr die Flüssigen Verdünnungen erst ab D6 angewendet werden, bei Kleinkindern von 1 bis 5 Jahren erst ab D3.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Formica in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Formica

Formica Ø (=D1) enthält 70 mg Alkohol (Ethanol) pro 10 Tropfen Arzneimittel, entsprechend 30 % (m/m) Alkohol. Die Menge in 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Formica D3, D6 und D12 enthalten jeweils 41 mg Alkohol (Ethanol) pro 10 Tropfen Arzneimittel, entsprechend 15 % (m/m) Alkohol. Die Menge in 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 1 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesen Arzneimitteln hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### 3. Wie ist Formica einzunehmen?

Nehmen Sie Formica immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

		<b>D12</b>
Erwachsene und Schulkinder ab 6 Jahren	<b>Ø – D6:</b> 1 – 3 mal täglich 5 – 10 Tropfen	bis 2 mal täglich 5 – 10 Tropfen
Kinder von 1 bis 5 Jahren	<b>D3 – D6:</b> 1 – 3 mal täglich 5 Tropfen	bis 2 mal täglich 5 Tropfen
Säuglinge im 1. Lebensjahr	<b>D6:</b> 1 – 3 mal täglich 3 – 5 Tropfen	bis 2 mal täglich 3 – 5 Tropfen

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

Bei Formica Ø (= D1) kann eventuell eine Trübung der Flüssigkeit auftreten. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

#### Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt bei Gicht innerhalb von 1 – 2 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Formica vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:	Alkohol in % (m/m)
Formica Ø (= D1)	Formica Ø *	10 ml 30
Formica D3	Formica Dil. D3 *	10 ml 15
Formica D6	Formica Dil. D6 *	10 ml 15
Formica D12	Formica Dil. D12 *	10 ml 15

\* [HAB, SV 4b, Ø mit Ethanol 94 % (m/m), gereinigtem Wasser, Ethanol 30 % (m/m) (1:2:7)]

Formica Ø=D1: 1 ml entspricht ca. 41 Tropfen

Formica D3, D6, D12: 1 ml entspricht ca. 35 Tropfen

#### Darreichungsformen und Packungsgrößen

Ø (= D1): 20 ml Urtinktur

D3 – D12: 50 ml Flüssige Verdünnung

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

Stand der Information: Mai 2024