

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil Sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Glycerin Lichtenstein N

Abführzäpfchen für Schulkinder und Erwachsene

Wirkstoff: Glycerol

ZUSAMMENSETZUNG

1 Suppositorium enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Glycerol 85 % 1,5 g

Sonstige Bestandteile: Hartfett, leichtes basisches Magnesiumcarbonat

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Suppositorien

Pharmazeutischer Unternehmer

Winthrop Arzneimittel GmbH

Industriestraße 10

82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 0 81 41/35 72-0

Fax: 0 81 41/35 72-5 99

Hergestellt von:

Amcapharm Pharmaceutical GmbH, Industriestraße 10 - 12, 61191 Rosbach

ANWENDUNGSGEBIETE

Bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie); zur Erweichung des Stuhls bei Haemorrhoiden und Analfissuren.

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Glycerin Lichtenstein N nicht anwenden?

Glycerol-Suppositorien sind nicht anzuwenden bei Vorliegen von Darmverschluß (Ileus) und unklaren Bauchschmerzen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Berichte über schädliche Wirkungen während der Schwangerschaft und Stillperiode sind nicht bekannt.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Glycerin Lichtenstein N oder werden in ihrer Wirkung von Glycerin Lichtenstein N beeinflusst?

Keine bekannt.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Glycerin Lichtenstein N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Glycerin Lichtenstein N sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Glycerin Lichtenstein N und wie oft sollten Sie Glycerin Lichtenstein N anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird bei Bedarf 1- bis 2mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Suppositorium in den Darm eingeführt.

Hinweis: Eine feuchte und glänzende Oberfläche der Suppositorien beeinflusst die Qualität und Wirksamkeit des Arzneimittels nicht.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Glycerin Lichtenstein N auftreten?

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Glycerin Lichtenstein N aufzubewahren?

Vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über +25 °C aufbewahren.

Stand der Information:

Januar 2005

ARZNEIMITTEL für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig