



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Venostasin<sup>®</sup> Tropfen

100 mg/ml Flüssigkeit

Zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen

Wirkstoff: Rosskastaniensamen-Trockenextrakt

129234

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** und wofür werden sie eingenommen?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** beachten?
3. Wie sind **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS SIND VENOSTASIN<sup>®</sup>-TROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE EINGENOMMEN?

**Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

**Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** werden traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Bei Auftreten von Krankheitszeichen, neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON VENOSTASIN<sup>®</sup>-TROPFEN BEACHTEN?

**Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** dürfen nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Trockenextrakt aus Rosskastaniensamen (Aescin) und/oder einem der sonstigen Bestandteile von **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** sind.

### Bei Einnahme von Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen mit anderen Arzneimitteln:

Aufgrund der hohen Eiweißbindung von Aescin kann die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** sollen in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden, da das Arzneimittel nur unzureichend im Tierversuch geprüft ist und Erfahrungen bei Schwangeren nicht ausreichend dokumentiert sind.

Da nicht bekannt ist, in welchem Ausmaß der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht, sollte während der Behandlung nicht gestillt werden.

### Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** sollten deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen:

Die Flüssigkeit enthält 14 Vol.-% Alkohol.

### Hinweis:

Die Anwendung von **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** ersetzt nicht sonstige vorbeugende Maßnahmen oder Behandlungsmaßnahmen wie z. B. kalte Wassergüsse oder das Tragen ärztlich verordneter Stützstrümpfe.

## 3. WIE SIND VENOSTASIN<sup>®</sup>-TROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie **Venostasin<sup>®</sup>-Tropfen** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 3 x täglich 5 Tropfen. Flasche beim Tropfen senkrecht nach unten halten!

### Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Die Einnahme erfolgt vor dem Essen in etwas Flüssigkeit.

**Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Einnahme ist prinzipiell nicht begrenzt. Beachten Sie jedoch bitte die Angaben unter Punkt 1.

**Wenn Sie eine größere Menge Venostasin®-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten:**

Wenn Sie versehentlich eine größere Menge **Venostasin®-Tropfen** eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

In Roskastaniensamen enthaltenen Saponine können bei Überdosierung das als Nebenwirkung bekannte Symptom Übelkeit verstärken, weiterhin sind Erbrechen und Durchfälle möglich.

Zur Entscheidung, ob Gegenmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Wenn Sie die Einnahme von Venostasin®-Tropfen vergessen haben:**

Wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, fahren Sie mit der Einnahme wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

**Wenn Sie die Einnahme abbrechen:**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Im Zweifelsfalle befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können **Venostasin®-Tropfen** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Mögliche Nebenwirkungen:**Überempfindlichkeitsreaktionen:

*Sehr selten:*

- Juckreiz,
- allergische Hautreaktionen.

In einem Fall wurde über das Auftreten einer schwerwiegenden allergischen Reaktion berichtet.

Verdauungstrakt:

*Sehr selten:*

- Übelkeit, Magen- und Darmbeschwerden.

Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautrötung und Juckreiz) soll das Arzneimittel nicht weiter eingenommen werden.

Beim Auftreten von Magen- oder Darmbeschwerden sollen die Tropfen zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE SIND VENOSTASIN®-TROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C aufbewahren. Glas nach Gebrauch fest verschließen.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch der Zubereitung:**

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Wochen.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was Venostasin®-Tropfen enthält:**

Der Wirkstoff ist Roskastaniensamen-Trockenextrakt.

1 ml Flüssigkeit (entsprechend 20 Tropfen und 1,06 g) enthält 100 mg Trockenextrakt aus Roskastaniensamen (4,5 - 5,5 : 1), Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Propylenglycol, Glycerol 85 %, Ethanol 96 %, Salzsäure 10 %, gereinigtes Wasser.

**Wie Venostasin®-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:**

Klare, leicht gelbliche Flüssigkeit.

Eine gelegentlich auftretende leichte Trübung, schwache Ausfällung oder leichte Schwankungen im Geschmack, wie sie bei Präparaten mit pflanzlichen Inhaltsstoffen vorkommen können, haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und Qualität von **Venostasin®-Tropfen**.

**Venostasin®-Tropfen** sind in Packungen mit 50 ml und 100 ml Flüssigkeit erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:	Hersteller:	Mitvertreiber:
Astellas Pharma GmbH Postfach 50 01 66 80971 München Tel.: (0 89) 45 44 01 Fax: (0 89) 45 44 13 29	Temmler Werke GmbH Postfach 80 10 62 81610 München	KLINGE PHARMA GmbH Postfach 50 01 67 80971 München Tel.: (0 89) 45 44 02 Fax: (0 89) 45 44 13 17 Internet: www.klinge.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2008.