

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### GEBRAUCHSINFORMATION

# Multilind®

## Heilsalbe

---

### mit Nystatin

---

#### Zusammensetzung

##### **Arzneilich wirksame Bestandteile:**

1 g Paste enthält 100.000 I.E. Nystatin und 200 mg Zinkoxid.

##### **Sonstige Bestandteile:**

Dickflüssiges Paraffin, Polyethylen, Parfümöl Citrus-Rose (u. a. Bergamottöl).

#### Darreichungsform und Inhalt

Tuben mit 25 g (N1) und 50 g (N2) Paste zur Anwendung auf der Haut  
Dispenser mit 100 g (N3) Paste zur Anwendung auf der Haut

#### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Antimykotikum kombiniert mit Zinkoxid

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

STADA GmbH  
Stadastraße 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Telefon: 06101 603-0  
Telefax: 06101 603-259  
Internet: www.stada.de

#### **Hersteller:**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastraße 2-18  
61118 Bad Vilbel

#### Anwendungsgebiete

Entzündungen der Haut und Schleimhaut, durch mechanische Reizung bedingtes Wundsein („Wolf“), rote, juckende und brennende Herde in den Körperfalten, im Gesäß- und Brustbereich und zwischen den Oberschenkeln, z. B. Windeldermatitis.  
Hautschäden, die zunächst durch mechanische Reizung hervorgerufen wurden, können später durch Bakterien und Pilze infiziert werden. Der Wirkstoff Nystatin dient zur Vorbeugung und Behandlung von Infektionen der Haut mit Hefepilzen (z. B. Candida albicans). Der Wirkstoff Zinkoxid eignet sich zur Behandlung entzündlicher und nässender Hautveränderungen mit oder ohne bakterielle Infektion.

#### Gegenanzeigen

**Wann dürfen Sie Multilind® Heilsalbe mit Nystatin nicht anwenden?**  
Sie dürfen Multilind® Heilsalbe mit Nystatin bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile nicht anwenden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

**Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**  
Falls eine Überempfindlichkeit auftritt, sollte das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden.  
Aufgrund des Gehalts an Bergamottöl sollte eine insensive UV-Bestrahlung (lange Sonnenbäder, Höhensonne, Solarien) vermieden werden, da die Lichtempfindlichkeit erhöht sein kann.

#### Wechselwirkungen

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

#### *Hinweis für die Anwendung im Genital- oder Rektalbereich:*

Bei gleichzeitiger Anwendung von Multilind® Heilsalbe mit Nystatin und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Multilind® Heilsalbe mit Nystatin nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Multilind® Heilsalbe mit Nystatin sonst nicht richtig wirken kann!

#### **In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Multilind® Heilsalbe mit Nystatin anwenden?**

Multilind® Heilsalbe mit Nystatin wird ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

#### **Wie lange sollten Sie Multilind® Heilsalbe mit Nystatin anwenden?**

Die Behandlung sollte noch einige Tage nach der vollständigen Abheilung fortgesetzt werden.

#### **Anforderungscoupon**

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an:

**STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel**

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Multilind® Heilsalbe mit Nystatin interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

### Anwendungsfehler und Überdosierung

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Multilind® Heilsalbe mit Nystatin angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**  
Führen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung empfohlen weiter.

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?**  
Die Erkrankung könnte sich verschlechtern.

### Nebenwirkungen

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Multilind® Heilsalbe mit Nystatin auftreten?**

In seltenen Fällen sind allergische Reaktionen gegen Bestandteile der Heilpaste (Nystatin, Zinkoxid, Polyethylen, dickflüssiges Paraffin, Parfümöl) möglich. Selten wurden Hautausschlag und Juckreiz beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

Bei Auftreten von schweren Hautreaktionen muss das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Multilind® Heilsalbe mit Nystatin kann nach Anbruch der Tube bzw. des Dispensers über die gesamte Behandlungsdauer verwendet werden.

Nach Beendigung der Therapie sollten angebrochene Tuben oder Dispenser mit Multilind® Heilsalbe mit Nystatin für eine spätere Behandlung nicht mehr eingesetzt werden.

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube bzw. Dispenser aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

**Wie ist Multilind® Heilsalbe mit Nystatin aufzubewahren?**  
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Stand der Information:

1. November 2004

### **Lieber Multilind® Kunde!**

Produktionstechnisch bedingt kann es bei dem Multilind® Dosierspender zu Lufteinschlüssen kommen. Diese können dazu führen, dass die Funktionsweise des Multilind® Dosierspenders eingeschränkt ist. Bitte gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Pumpvorgang mehrmals wiederholen oder
2. mit einem Gegenstand Hubkolben vorsichtig hochschieben, so dass der Kolben wieder Kontakt zur Salbe hat oder
3. den Dosierspender auf eine harte Unterlage stoßen.

### **Liebe Eltern, liebe Patientin, lieber Patient,**

Die Haut ist unser größtes Organ, das uns vor aggressiven äußeren Einflüssen schützt und den Wasser- und Wärmehaushalt für den ganzen Körper regelt. Eine intakte Haut ist lebensnotwendig! Bei Babys und Kleinkindern, aber auch bei älteren Menschen ist die Barriere der Haut noch nicht voll entwickelt oder geschwächt, sodass sich schon bei leichteren Verletzungen oder wund geriebenen Stellen Mikroorganismen ansiedeln können und dem Körper arg zusetzen können.

Bakterien und Pilze vermehren sich besonders in dem feuchtwarmen Reizklima von Einlagen und Windeln sowie durch Schwitzen in zu enger und falscher Kleidung.

Neben starker Rötung und Juckreiz treten häufig Bläschen, Krusten und Schuppung sowie nässende Absonderungen der Haut auf. Pflegeprodukte allein reichen dann nicht mehr aus.

Besonders bewährt bei dieser Hautentzündung (Windeldermatitis, Wolf) hat sich **Multilind® Heilsalbe mit Nystatin mit den Wirkstoffen Nystatin und Zinkoxid.**

Nystatin wirkt besonders schnell und gut gegen Hefepilze und beugt erneutem Befall vor. Es ist gut verträglich, da es nur in die äußeren befallenen Hautschichten eindringt und vom Körper nicht aufgenommen wird.

Zinkoxid trocknet die Haut sanft ab, hemmt den Juckreiz und die Entzündung und bremst die Vermehrung von Bakterien. **Multilind® Heilsalbe mit Nystatin** lässt sich durch die speziell entwickelte **Soft-Formel** besonders leicht und schmerzlos dünn auftragen und ist ergiebig und sparsam.

Stellt sich innerhalb von wenigen Tagen keine Besserung der Beschwerden ein, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, der die Ursachen im Einzelnen abklären kann und die weitere Behandlung übernimmt.

Sind Sie an mehr Informationen interessiert, so senden Sie uns den anhängenden Abrufcoupon oder besuchen Sie uns auf unserer Website.

9210583  
0411

STADA

Name:

PLZ/Ort:

Vorname:

E-Mail:

Straße:

Geburtsdatum:

10010081 08/04