

<Bayerkreuz>

Canesten® Tropflösung Spray

Lösung mit 1 % Clotrimazol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Canesten® Tropflösung Spray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Canesten Tropflösung Spray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Canesten Tropflösung Spray beachten?
3. Wie ist Canesten Tropflösung Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Canesten Tropflösung Spray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST CANESTEN TROPFLÖSUNG SPRAY UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Canesten Tropflösung Spray ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen (Mykosen) der Haut. Der Wirkstoff Clotrimazol dringt in die befallenen Hautschichten ein und greift dort den Pilz an. Die Folge: der Pilz stirbt ab oder wird in seinem Wachstum gehemmt.

Canesten Tropflösung Spray wird angewendet:

Zur Behandlung von Pilzkrankungen (Mykosen) der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere, wie *Malassezia furfur*, sowie Hautinfektionen durch *Corynebacterium minutissimum*.

Diese können vorkommen z. B. in Form von:

Mykosen der Füße (Fußpilz), zwischen Zehen und Fingern, am Nagelfalz (Paronychien), auch in Verbindung mit Nagelmykosen; Hauterkrankungen, die mit Canesten-empfindlichen Erregern superinfiziert sind; Mykosen der Haut und Hautfalten; oberflächigen Candidosen; Pityriasis versicolor (Kleienpilzflechte); Infektionen mit *Corynebacterium minutissimum* (Erythrasma); seborrhoischer Dermatitis nur bei mikrobieller Mitbeteiligung o. a. Erreger.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON CANESTEN TROPFLÖSUNG SPRAY beachten?

Canesten Tropflösung Spray darf nicht angewendet werden

wenn Sie bei der Behandlung einer früheren Pilzinfektion Canesten Tropflösung Spray oder ein Medikament mit dem gleichen Wirkstoff (Clotrimazol) nicht vertragen haben. In diesem Fall sollten Sie vor der Behandlung mit Ihrem Arzt sprechen.

Canesten Tropflösung Spray darf nicht in die Augen gelangen.
Canesten Tropflösung Spray soll nicht auf Schleimhäute aufgetragen werden, da aufgrund des Gehaltes an Propylenglycol eine lokale Reizung möglich ist.

Bei Anwendung von Canesten Tropflösung Spray mit anderen Arzneimitteln
sind bislang keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie Canesten Tropflösung Spray anwenden, wie in der "Dosierungsanleitung" beschrieben oder von Ihrem Arzt oder Apotheker empfohlen, wird der Wirkstoff Clotrimazol nur in sehr geringer Menge in den Körper aufgenommen; mit einer systemischen Wirkung (Wirkung auf andere Organe) ist deshalb nicht zu rechnen. Studien zur Anwendung von Canesten Tropflösung Spray während der Schwangerschaft liegen nicht vor. Während der Stillzeit sollte Canesten Tropflösung Spray nicht an der milchgebenden Brust angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Canesten Tropflösung Spray

Propylenglycol kann Hautreizungen verursachen.

3. WIE IST CANESTEN TROPFLÖSUNG SPRAY ANZUWENDEN?

Wenden Sie Canesten Tropflösung Spray immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Die Lösung 1-3mal täglich auf die erkrankte Haut und die angrenzenden gesunden Hautbereiche dünn aufsprühen und einreiben.

Die Behandlungsdauer ist unter anderem abhängig vom Ausmaß und Ort der Erkrankung. Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht nach dem Abklingen der Beschwerden abgebrochen, sondern bis zu einer Therapiedauer von mindestens 4 Wochen konsequent fortgeführt werden. Pityriasis versicolor heilt im Allgemeinen in 1-3 Wochen und Erythrasma in 2-4 Wochen ab.

Bei Fußpilz sollte - um Rückfällen vorzubeugen - trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiterbehandelt werden.

Wenn Sie eine größere Menge Canesten Tropflösung Spray angewendet haben, als Sie sollten

Folgen der Anwendung zu großer Mengen von Canesten Tropflösung Spray sind nicht bekannt; es liegen keine Berichte hierzu vor.

Wenn Sie die Anwendung von Canesten Tropflösung Spray vergessen haben

Wenden Sie beim nächsten Mal nicht eine größere Menge Canesten Tropflösung Spray an, sondern setzen Sie die Behandlung wie empfohlen fort.

Wenn Sie die Anwendung von Canesten Tropflösung Spray abbrechen

Um eine vollständige Ausheilung der Pilzinfektion zu erreichen und einem Rückfall vorzubeugen, sollten Sie möglichst nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt die Behandlung vorzeitig beenden

oder unterbrechen. Wenn Sie dies dennoch tun, ist eine Wiederkehr der Beschwerden zu befürchten, da Ihre Pilzerkrankung wahrscheinlich noch nicht richtig ausgeheilt ist. Die Behandlung sollten Sie auch nicht nach dem Abklingen der Beschwerden abbrechen, sondern konsequent fortführen (wie unter "Dosierungsanleitung" empfohlen).

Was können Sie zusätzlich tun?

Wechseln Sie täglich Handtücher, Wäsche und Strümpfe, die mit der erkrankten Hautstelle in Berührung kommen. Schon diese einfache Maßnahme unterstützt die Ausheilung und verhindert eine Übertragung auf andere Körperstellen und Personen.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Canesten Tropflösung Spray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten: weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Mögliche Nebenwirkungen:

Gelegentlich können Hautreaktionen wie Brennen, Stechen oder eine Rötung an den behandelten Hautstellen auftreten. Es kann zu einer Austrocknung der behandelten Hautstellen kommen.

Wenn die oben aufgeführten Nebenwirkungen zum ersten Mal auftreten oder Ihre Beschwerden sich verschlimmern sollten, verwenden Sie Canesten Tropflösung Spray nicht weiter und suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST CANESTEN TROPFLÖSUNG SPRAY AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Die Lösung kann auch nach Anbruch bis zum Erreichen des Verfalldatums (s. Faltschachtel-aufdruck) verwendet werden.

Aufbewahrungsbedingungen

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was enthält Canesten Tropflösung Spray:

Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 ml Lösung enthält 0,01 g Clotrimazol.

Sonstige Bestandteile: Macrogol 400, 2-Propanol, Propylenglycol.

Wie sieht Canesten Tropflösung Spray aus und Inhalt der Packung:

Canesten Tropflösung Spray ist in einer Kunststoff-Pumpsprayflasche zu 30 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324
24106 Kiel, Deutschland

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet am:

November 2012 /D 7