

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten	Selten: weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

4.1 Nebenwirkungen

Gelegentlich kann es zu Reaktionen an den behandelten Hautabschnitten (z. B. vorübergehendes Brennen, Stechen, Taubheitsgefühl) kommen. Sind die Nebenwirkungen sehr stark, so brechen Sie die Behandlung ab und informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4.2 Gegenmaßnahmen

Sollten Sie unerwünschte Wirkungen bei sich feststellen, informieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder Apotheker, damit er den Schweregrad feststellen und ggf. über erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden bzw. Sie beraten kann.

4.3 Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
Das Präparat ist nach dem Öffnen 1 Jahr haltbar.

Stand der Information: Januar 2007

Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Fenistil Pencivir bei Lippenherpes jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes beachten?
3. Wie ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes aufzubewahren?

Fenistil[®] Pencivir bei Lippenherpes

Wirkstoff: Penciclovir



Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Penciclovir.
1 g Creme enthält 10 mg Penciclovir.

Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol; gereinigtes Wasser; weißes Vaselin; Cetylstearylalkohol; dickflüssiges Paraffin; Cetomacrogol 1000.

Darreichungsform und Inhalt

Fenistil Pencivir bei Lippenherpes ist in Packungen zu 2 g Creme/N1 erhältlich.

1. Was ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes und wofür wird es angewendet?

1.1 Fenistil Pencivir bei Lippenherpes ist ein

Arzneimittel, dessen Wirkstoff das Wachstum bestimmter Viren hemmt (Virustatikum).

1.2 von:

Novartis Consumer Health GmbH
 ✉ 81366 München
 🏠 Zielstattstraße 40, 81379 München
 ☎ Telefon (089) 78 77-0
 📠 Telefax (089) 78 77-444

1.3 Fenistil Pencivir bei Lippenherpes wird angewendet

Zur lindernden Therapie von Schmerzen und Juckreiz sowie zur Beschleunigung der Krustenbildung beim natürlichen Heilungsverlauf von akuten Episoden leichter Formen wiederholt auftretender Lippenbläschen (rezidivierender Herpes labialis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes beachten?

2.1 Fenistil Pencivir bei Lippenherpes darf nicht angewendet werden

- wenn bei Ihnen bereits früher nach der Anwendung von Aciclovirhaltigen Cremes oder von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes eine Kontaktallergie aufgetreten ist oder Sie bekanntermaßen auf Famciclovir oder einen der Inhaltsstoffe von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes allergisch reagieren.
- Fenistil Pencivir bei Lippenherpes darf nicht auf Schleimhäuten (z. B. im Mund oder Genitalbereich) angewendet werden. Sie sollten speziell darauf achten, eine Anwendung im Auge oder in der Nähe des Auges zu vermeiden.
- Fenistil Pencivir bei Lippenherpes darf nicht bei immunsupprimierten Patienten, also bei Patienten, deren körpereigene Immunabwehr unterdrückt wird, angewendet werden.

2.2 Besondere Vorsicht bei Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes ist erforderlich

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen sind während der Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes nicht erforderlich. Wenn Sie sich nicht sicher sein sollten, ob Sie an Lippenherpes (Herpes labialis) leiden, fragen Sie Ihren Arzt um Rat. Weitere Angaben siehe Punkt 2.1 und 3.2.

a) Kinder:

Über die Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes bei Patienten unter 12 Jahren liegen noch keine Erfahrungen vor. Aus diesem Grund darf Fenistil Pencivir bei Lippenherpes bei diesen Patienten nicht angewendet werden.

b) Schwangerschaft und Stillzeit:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt und fragen Sie ihn um Rat, wenn Sie schwanger sind oder stillen, da Fenistil Pencivir bei Lippenherpes während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet werden sollte.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

c) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

d) Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes:

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie dennoch Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Für Fenistil Pencivir bei Lippenherpes liegen keine Hinweise auf Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.

3. Wie ist Fenistil Pencivir bei Lippenherpes anzuwenden?

Wenden Sie Fenistil Pencivir bei Lippenherpes immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Bitte wenden Sie Fenistil Pencivir bei Lippenherpes möglichst unmittelbar nach dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen (z. B. Brennen, Juckreiz) an. Sollten sich jedoch bereits Bläschen gebildet haben, können Sie dennoch mit der Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes beginnen, da auch eine spätere Anwendung den Heilungsprozess beschleunigt und die Schmerzdauer verkürzt.

Sie sollten Fenistil Pencivir bei Lippenherpes während des Wachseins in 2-stündigen Abständen (mindestens 6- bis 8-mal täglich, am 2. Behandlungstag auch 10- bis 12-mal) dünn auf die infizierten Stellen mit einem sauberen Finger auftragen. Alternativ hierzu können Sie auch ein Wattestäbchen verwenden, das mit einer für die Größe des betroffenen Hautbereiches notwendigen Menge bestrichen wurde. Falls Sie Fenistil Pencivir bei Lippenherpes mit dem Finger auftragen sollten, waschen Sie sich bitte vor und nach dem Auftragen der Creme gründlich die Hände.

Sie sollten die Creme nach dem Essen anwenden. Falls Sie die Creme bereits eine Stunde nach Anwendung versehentlich abgerieben haben, sollten Sie eine zusätzliche Anwendung durchführen.

Die Behandlung mit Fenistil Pencivir bei Lippenherpes dauert in der Regel 4 bis 5 Tage. Halten Sie bitte diese Zeit auch dann ein, wenn Sie sich bereits früher besser fühlen. Bitte brechen Sie die Behandlung auch dann nicht ab, wenn nicht sofort eine wesentliche Besserung eingetreten ist.

Wenn es während der Behandlung mit Fenistil Pencivir bei Lippenherpes zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen kommt brechen Sie die Behandlung bitte ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Ebenso sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Ihr Lippenherpes nach der Behandlung mit Fenistil Pencivir bei Lippenherpes nicht richtig verheilt.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes zu stark oder zu schwach ist.

3.3 Wenn Sie eine größere Menge von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie eine große Menge Fenistil Pencivir bei Lippenherpes auf einmal auf die Haut aufgebracht haben, so sind außer leichten Hautirritationen (siehe "Nebenwirkungen") keine schädigenden Wirkungen zu erwarten. Wenn Fenistil Pencivir bei Lippenherpes einmal versehentlich verschluckt wurde, sind außer Irritationen im Bereich der Mundschleimhaut ebenfalls keine schädigenden Wirkungen zu erwarten. In beiden Fällen sind keine speziellen Behandlungen notwendig. Sollten Sie dennoch Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

3.4 Wenn Sie die Anwendung von Fenistil Pencivir bei Lippenherpes vergessen haben

Wenn Sie ein oder zwei Mal vergessen haben, Ihr Fenistil Pencivir bei Lippenherpes zur vorgesehenen Zeit aufzutragen, holen Sie dies nach, sobald es Ihnen möglich ist (längere Pausen können Einfluss auf die Wirkung haben). Die nächsten Anwendungen sollten dann wieder alle 2 Stunden erfolgen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Fenistil Pencivir bei Lippenherpes Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt: