

Gebrauchsanweisung:

Lento Nit® K Augentropfen

Inhaltsstoffe:

Kaliumiodid, Calciumchlorid 2 H₂O, Natrium-thiosulfat 5 H₂O, Sorbitol, Aqua purificata, Chlorhexidindigluconat (Konservierungsmittel)

Anwendungsgebiete:

Augentropfen zur Befeuchtung der Augenoberfläche sowie zur Prophylaxe bei Trübungen im Linsen- und Glaskörperbereich des Auges.

Gegenanzeigen:

Lento Nit® K darf nicht angewendet werden bei Überfunktion der Schilddrüse bzw. Jodüberempfindlichkeit. Die Anwendung von Lento Nit® K in der Schwangerschaft und Stillzeit oder bei Kindern sollte nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Hinweise:

- Auswirkungen von Lento Nit® K auf die Teilnahme am Straßenverkehr, auf die Arbeit an Maschinen oder auf Tätigkeiten ohne sicheren Halt sind nicht bekannt
- Unmittelbar nach dem Eintropfen kann Ihre Sehfähigkeit kurzfristig beeinträchtigt sein
- Lento Nit® K nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist
- Verwenden Sie Lento Nit® K nicht gleichzeitig mit anderen Präparaten zur Anwendung am Auge, weil dadurch gegebenenfalls die Wirkung der Präparate verändert wird. Für den Fall, dass andere Präparate am Auge angewendet werden, sollte grundsätzlich ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten zwischen den einzelnen Anwendungen eingehalten werden
- Nehmen Sie die Kontaktlinsen vor der Anwendung von Lento Nit® K heraus. Nach 15 Minuten können diese wieder eingesetzt werden
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tropferspitze mit der Augenoberfläche oder Gegenständen, um Verunreinigungen zu vermeiden

Es wird empfohlen, die Anwendung mit zuvor sorgfältig gereinigten Händen durchzuführen:

- Verschlusskappe abziehen
- Kopf etwas zurücklegen
- Unterlid leicht nach unten ziehen und 1–2 Tropfen durch leichten Druck auf den Flaschenboden oder die Flasche von oben in den Bindehautsack eintropfen
- Flasche mit der Öffnung nach unten (senkrecht) halten
- Anwendung am anderen Auge wiederholen
- Verschlusskappe wieder aufsetzen

Wechselwirkungen:

Es wurden keine Wechselwirkungen beobachtet. Grundsätzlich könnten höhere Dosen Kaliumiodid in Verbindung mit kaliumsparenden Diuretika (Stoffe, die die Harnausscheidung steigern) zu Hyperkallämie (erhöhten Serum-Kalium-Werten) führen. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben ggf. auch für vor kurzem angewandte Produkte gelten könnte.

Dosieranleitung:

Tropfen Sie 3 x täglich 1–2 Tropfen Lento Nit® K in den Bindehautsack ein.

Anwendungsfehler:

Bei einer einmaligen Anwendung von Lento Nit® K in zu großer Menge ist nicht mit Auswirkungen zu rechnen.

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist mit Nebenwirkungen nicht zu rechnen. Sollten Sie dennoch Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. In diesem Fall das Präparat nicht weiter anwenden.

Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung:

Lagerung bei 2°C - 25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

10 ml Lento Nit® K Augentropfen
3x10ml Lento Nit® K Augentropfen

Stand der Information: 2025-11



Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17
DE-85399 Hallbergmoos



Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
IT-39100 Bolzano (BZ)



0051



Hersteller



Vertriebspartner



Verfalldatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Herstellungsdatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat)



Chargen-Nummer



Lagertemperatur 2°C – 25°C



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist



Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Medizinprodukt

optima