

Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.

Salus[®]

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Kräuterblut[®] Floradix[®] mit Eisen

Lösung zum Einnehmen für Erwachsene und Heranwachsende
ab 6 Jahren.

Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat

Eisenmangelprophylaktikum

Anwendungsgebiete:

Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist.

Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten.

Gegenanzeigen:

Eisenkumulation, Eisenverwertungsstörungen. *Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie Floradix mit Eisen nur einnehmen, wenn Ihr Arzt bei Ihnen einen Eisenmangel festgestellt hat. Wenn Sie stillen, sollten Sie Floradix mit Eisen nur auf Anordnung Ihres Arztes einnehmen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Um das Risiko einer möglichen Eisenüberdosierung zu vermeiden, ist besondere Vorsicht geboten, falls diätetische oder andere Eisensalz-Ergänzungen verwendet werden.

Bei vorbestehenden Entzündungen oder Geschwüren der Magen-Darmschleimhaut sollte der Nutzen der Behandlung sorgfältig gegen das Risiko einer Verschlimmerung der Magen-Darmerkrankung abgewogen werden.

Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Fructose. Bitte nehmen Sie Floradix mit Eisen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Floradix mit Eisen kann schädlich für Zähne sein (Karies).

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

- Eisensalze verringern die Resorption von Tetracyclinen, Penicillamin, Goldverbindungen, Levodopa und Methylodopa.
- Eisensalze beeinflussen die Resorption von Chinolon-Antibiotika (z. B. Ciprofloxazin, Levofloxazin, Norfloxazin, Ofloxazin)
- Eisensalze vermindern die Resorption von Thyroxin bei Patienten, die eine Substitutionstherapie mit Thyroxin erhalten.
- Die Resorption von Eisen wird durch gleichzeitige Anwendung von Cholestyramin, Antacida (Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Al⁺⁺⁺-Salze) sowie Calcium- und Magnesium-Ergänzungspräparaten herabgesetzt.
- Die gleichzeitige Einnahme von Eisensalzen mit Salicylaten oder nichtsteroidalen Antirheumatika kann die Reizwirkung des Eisens auf die Schleimhaut des Magen-Darm Traktes verstärken.
- Eisenbindende Substanzen wie Phosphate, Pyruvate oder Oxalate sowie Milchprodukte, Kaffee, schwarzer und grüner Tee hemmen die Eisenresorption.

Floradix mit Eisen sollte entweder eine halbe Stunde vor oder 2 Stunden nach diesen Substanzen eingenommen werden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 10 Jahren 3 x 15 ml pro Tag mit dem beiliegenden

Messbecher ein. 45 ml Floradix mit Eisen enthält 36,8 mg verwertbares Eisen(II).

Die Einnahme erfolgt am besten gekühlt 1/2 Stunde vor den Mahlzeiten.

Kinder von 6-10 Jahre: 2 x 15 ml
30 ml Floradix mit Eisen enthält 24,5 mg Eisen(II).

Hinweise zu Aufbewahrung und Haltbarkeit:

Nicht über 25° C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 4 Wochen.

Die Flasche muss nach Gebrauch sofort verschlossen und im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Dieses Arzneimittel darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und auf der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nebenwirkungen:

Gastrointestinale Störungen, wie z. B. Magendruck, Völlegefühl und Verstopfung.

Hinweis: Wie bei allen eisenhaltigen Arzneimitteln kann eine völlig harmlose Dunkelfärbung des Stuhls auftreten. Diese Stuhlfärbung ist unbedenklich. Durch die Einnahme von flüssigen Eisenpräparaten kann es in Einzelfällen zu geringfügigen Dunkelfärbungen der Zahnoberflächen kommen, die durch gründliches Zähneputzen leicht entfernbar sind. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Zusammensetzung:

100 ml (entsprechend ca. 109 g) enthalten als Wirkstoff: 703,3 – 773,9 mg Eisen(II)-gluconat (Ph. Eur.) entsprechend 81,75 mg Eisen(II)-Ionen. **Sonstige Bestandteile:** Ascorbinsäure, Wässriger Auszug (1:28,2) aus einer Mischung von Hibiskusblüten, Bitterer Fenchel, Mohrrübe, Queckenwurzelstock, Schafgarbenkraut, Angelikawurzel, Schachtelhalmkraut, Spitzwegerichblätter, Wacholderbeeren, Wegwartenwurzel, Bitterorangenschale (3:2,3:2,3:2,3:2,3:1,15:1,15:1,15:1,15:1:0,64) – Auszugsmittel Wasser, Hefeautolysat, Traubensaft-Konzentrat rot, Kirschsaf-Konzentrat, Birnensaft-Konzentrat, Brombeersaft-Konzentrat, Schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat, Honig, Hagebutten-Dickextrakt, Fructose-Sirup 70 %ig, Orangenaroma, Apfelsinenaroma, Wasser.

10 ml Flüssigkeit enthalten 0,185 BE

Hinweis: glutenfrei und jodfrei

Darreichungsform und Inhalt:

Packung mit 15 ml Lösung zum Einnehmen
Packung mit 250 ml Lösung zum Einnehmen
Packung mit 500 ml Lösung zum Einnehmen
Packung mit 700 ml Lösung zum Einnehmen
Packung mit 2 x 500 ml Lösung zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Pharma GmbH
Otto-von-Steinbeis-Str. 16, 83052 Bruckmühl

Zulassungsinhaber:

SALUS Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

Fassung der Packungsbeilage:

November 2010