Ambro-ratiopharm® 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff/Wirkmechanismus:

Ambroxol gehört zur Arzneimittelklasse der sogenannten Mukolytika, die dazu beitragen, die Atemwege von Schleim (Mucus) zu befreien.

Anwendungsgebiet:

Ambroxol wird bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren angewendet, um Schleim zu lösen und dessen Abtransport zu fördern, z.B. bei Erkältungen und gripalen Infekten.

Dosierung/Einnahmehinweis:

Erwachsene:

In den ersten 2 – 3 Tagen sind 5 ml Ambro-ratiopharm® 6 mg/ml 3-mal täglich (alle 8 Stunden) einzunehmen. Danach werden 5 ml Ambro-ratiopharm® 6 mg/ml 2-mal täglich (alle 12 Stunden) empfohlen. Eine erhöhte Wirksamkeit ist bei Einnahme von 10 ml Ambro-ratiopharm 6 mg/ml 2-mal täglich (alle 12 Stunden) möglich.

Kinder von 6 bis 12 Jahren:

2,5 ml Ambro-ratiopharm 6 mg/ml 2- bis 3-mal täglich.

Kinder von 2 bis 5 Jahren:

1,25 ml Ambro-ratiopharm 6 mg/ml 3-mal täglich.

Hinweise/Zielgruppe:

- Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene mit produktivem Husten

Vorteile Ambroxol:

- Gut verträglich
- Schneller Wirkeintritt

Vorteile Ambro-ratiopharm® 6 mg/ml:

- Individuell dosierbar
- Angenehmer Geschmack nach Himbeere
- Hohe Dosierung (6 mg/ml)
- Dosierspritze liegt bei
- Geringer Kohlenhydrat-Gehalt (5 ml entspr. 0,03 BE)
- Soja-/Gluten-/Laktose-/Zucker-/Alkoholfrei

Tipps:

- Viel trinken ermöglicht leichtes Abhusten des Schleimes
- Einnahme mit Abstand zu hustenstillenden Mitteln

Ambro-ratiopharm® 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen. Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** 1 ml Lösung z. Einnehmen enth.: 6 mg Ambroxolhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.:** Acesulfam-Kalium, Benzoesäure, Glycerol 85 %, Hyetellose, Propylenglycol, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), Himbeer-Aroma, o.w.A, Vanille-Aroma, o.w.A, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Bei Erw. und Kdrn. über 2 J. zur schleimlösenden Therapie im Rahmen der Behandl. von Atemwegserkrank., die mit abnormer Schleimsekretion und –transportstör. einhergehen, die die Mukussekretion und-clearance beeinträchtigen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gg. Ambroxol od. einen der sonst. Bestandt., Kdr. unter 2 J., Pat. mit einer seltenen angeborenen Fruktoseintoleranz. Pat. mit einer seltenen angeborenen Stör., die mit einer Unverträglichkeit ggü. einem der sonst. Bestandt. des AMs verbunden sein kann. **Warnhinw.:** AM enth. 245 mg Sorbitol! **Schwangerschaft/Stillzeit:** Anw. währ. der Schwangerschaft insbes. im 1. Drittel nicht empfohlen und währ. der Stillzeit nur nach sorgf. Nutzen-Risiko-Abwägung. **Nebenwirkungen:** Rhinorrhö; Trockenheit der Atemwege, Hypoästhesie im Rachen. Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Geschmacksstör., Mundtrockenheit, Sodbrennen, Obstipation, Sialorrhö. Dysurie. Überempfindlichkeitsreaktionen (einschl. Hautausschlag, Schleimhautschwellungen, Angioödem, Atemnot, Juckreiz), Fieber, anaphylaktische Reaktionen, einschl. anaphylaktischer Schock, Urtikaria. **Wechselwirkungen:** Antitussiva, Antibiotika (Amoxicillin, Cefuroxim, Erythromycin). **Dosierung:** Kdr. und Jugendl.: Kdr. unter 2 J. kontraind. Kdr. 2-5 J.: 1,25 ml (eine viertel Spritze) 3-mal tgl. (alle 8 Stunden) (entspr. 22,5 mg Ambroxolhydrochlorid am Tag). Kdr. 6-12 J.: 2,5 ml (eine halbe Spritze) 2- bis 3-mal tgl. (alle 12 od. 8 Stunden) (entspr. 30–45 mg Ambroxolhydrochlorid am Tag). Erw. und Jugendl. ab 12 J.: In den ersten 2–3 Tagen sind üblicherw. 5 ml (eine Spritze) 3-mal tgl. (alle 8 Stunden) einzunehmen (entspr. 90 mg Ambroxolhydrochlorid am Tag). Danach 5 ml (eine Spritze) 2-mal tgl. (alle 12 Stunden) (entspr. 60 mg Ambroxolhydrochlorid am Tag). Stand: 1/13