



## Gebrauchsinformation

# DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX

## Lösung

### Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat)

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn bei akuten Beschwerden nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX beachten?
3. Wie ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1 Was ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX und wofür wird es angewendet?

DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX ist ein Mundhöhlen-Antiseptikum. Es wird angewendet:

- zur vorübergehenden Verminderung von Bakterien in der Mundhöhle
- zur vorübergehenden zusätzlichen Behandlung
- zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut
- bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit.

## 2 Was müssen Sie vor der Anwendung von DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX beachten?

### 2.1 DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich gegenüber Chlorhexidin sind
- bei Wunden, bei Geschwüren
- bei schlecht durchblutetem Gewebe in der Mundhöhle

### 2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX ist erforderlich,

bei ausfurchenden, schuppigen Veränderungen der Mundschleimhaut.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen oder Untersuchungen zur Sicherheit einer Anwendung von Chlorhexidin, dem Wirkstoff in DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX, in Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb sollte

DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX nur unter besonderer Vorsicht angewendet werden.

## 2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirksamkeit von DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX wird durch Seifen und andere anionische Substanzen, die in der Regel auch in Zahnputzmitteln enthalten sind, vermindert. Chlorhexidin wird durch Rohrzucker (Saccharose) unwirksam.

## Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält 12 Vol % Ethanol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bis zu 1 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

## 3 Wie ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX anzuwenden?

Wenden Sie DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Wenn Sie DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX über längere Zeit anwenden wollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Zahnarzt.

### 3.1 Art und Dauer der Anwendung

Die Lösung sollte ohne ärztliche oder zahnärztliche Empfehlung nicht länger als 6 Wochen angewendet werden.





### 3.2 Dosierung

Soweit nicht anders verordnet, spülen Sie mit DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX 2 bis 3 mal täglich nach den Mahlzeiten und dem Zähneputzen. Spülen Sie den Mund nach dem Zähneputzen zunächst gründlich mit Wasser aus, um Zahnpastareste zu entfernen. Anschließend spülen Sie bitte etwa 1 Minute lang mit mindestens 10 ml (siehe Messbecher) der unverdünnten DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX Lösung.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Dynexan Proaktiv® 0,1 % CHX angewendet haben, als Sie sollten

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch können die von der Haut oder Schleimhaut resorbierten Mengen Chlorhexidin vom menschlichen Organismus ohne toxische Zeichen entgiftet werden. Bei lokaler Überdosierung kann DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX durch Spülen mit Wasser entfernt werden.

### 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX Nebenwirkungen haben. Es kann in seltenen Fällen (> 0,01 % – < 0,1 %) zur kurzzeitigen Beeinträchtigung des Geschmacksempfindens, einem vorübergehenden Taubheitsgefühl der Zunge und zu vorübergehenden Verfärbungen von Zunge sowie Zähnen und Restaurationen (dies sind z. B. Füllungen) kommen.

In Einzelfällen (< 0,01 %) können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Bestandteile von DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX auftreten.

### Unbekannte Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### 5 Wie ist DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX aufzubewahren?

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung bitte nicht mehr nach diesem Datum. Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses noch 6 Monate haltbar. Nicht über 25 °C lagern.

## 6 Weitere Informationen

### 6.1 Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten als:

#### arzneilich wirksamen Bestandteil

0,5 g Chlorhexidindigluconat-Lösung 20 % (entsprechend Chlorhexidinbis(D-gluconat) 0,1 g).

#### Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96 %, Glycerol, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Minzöl, Pfefferminzöl, gereinigtes Wasser.

### 6.2 Darreichungsform und Inhalt

DYNEXAN PROAKTIV® 0,1 % CHX ist in Flaschen mit 200 ml gebrauchsfertiger Lösung erhältlich.

### 6.3 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingaustraße 87–93 · D-65203 Wiesbaden  
www.kreussler.com  
E-Mail: info@kreussler.com

## 6.4 Stand der Information

Mai 2012

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Frei verkäuflich

**kreussler**  
PHARMA

10 EU 4053 a 13.06

