

## Zur vorübergehenden Ernährung inappetenter Pflanzenfresser

Alleinfuttermittel für Kaninchen, Meerschweinchen, Degu und Chinchilla

### Zur vorübergehenden Ernährung

- inappetenter Tiere
- geschwächter Tiere
- vor/nach Zahnbehandlungen
- in der Rekonvaleszenz

**RodiCare® instant** ist ein hochwertiges pulverförmiges Alleinfuttermittel für Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas und Degus, die vorübergehend selbstständig keine feste Nahrung aufnehmen können. **RodiCare® instant** kann auch als Futtergrundlage für andere inappetente Kleinnager und pflanzenfressende Reptilien und Vögel genutzt werden, muss dann aber nach den Bedürfnissen der Spezies ergänzt werden.

**RodiCare® instant** ist ebenfalls als Aufzuchtmittel für verwaiste Jungtiere sowie zur ergänzenden Fütterung von schwachen und kümmernden Jungtieren geeignet, die nicht mehr ausschließlich auf Milch angewiesen sind.

**RodiCare® instant** enthält alle lebensnotwendigen Vitamine und Mineralien. Mit seinem hohen Vitamin C-Gehalt gewährleistet es eine ausreichende Versorgung auch bei Meerschweinchen, die vorübergehend kein Frischfutter erhalten.

Ein hoher Anteil an Rohfasern sorgt für eine ausreichende Verdauungstätigkeit. Darüber hinaus enthält **RodiCare® instant** eine speziell abgestimmte Kräutermischung, welche die Verdauung fördert und den Appetit anregt.

### Zusammensetzung:

Sojabohnenschalen 28,4%, Haferkleie 18,8%, Luzerne 15,5%, Weizenkeime 14%, Leinkuchen 5%, Sojaproteinkonzentrat 4%, Bierhefe 2,5%, Rapsöl 1,5%, Minze 1%, Kümmelsaat 1%, Bockshornkleesaat 0,5%, Süßholz 0,5%, Curcuma 0,5%, Kalmuswurzel 0,5%, Fenchelsaat 0,5%,



Ein hoher Gehalt an **Rohfasern** ist Grundlage für den Erhalt der Darmflora und fördert die Darmperistaltik.

**Schnell verfügbare Energie** gewährleistet die Aufrechterhaltung des empfindlichen Energiestoffwechsels in der Leber.

**Fructo-Oligosaccharide (FOS)** fördern selektiv die erwünschte Darmflora in Blind- und Dickdarm (Präbiotika).

**Vitamine und Mineralstoffe** verhindern ernährungs- und krankheitsbedingte Defizite.

**Bockshornkleesamen, Kalmuswurzel und Curcuma** regen Appetit und Verdauungstätigkeit an.

**Kamillenblüten, Pfefferminze, Fenchel, Kümmel und Süßholz** ergänzen die Nahrung mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen.

Kamillenblüten 0,5%, Natriumchlorid 0,5%, Fructo-Oligosaccharide 0,25%

## Analytische Bestandteile:

Rohprotein	16,3 %	Rohfaser	21 %
Rohölö u. -fette	4,8 %	Rohasche	6,9 %
Calcium	0,7 %	Natrium	0,4 %
Phosphor	0,4 %		

## Zusatzstoffe pro kg:

### Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A [3a672a]	11.400	IE
Vitamin D/Vitamin D <sub>3</sub> [E 671]	760	IE
Vitamin E	38	mg
Vitamin C	9.510	mg
Vitamin K <sub>3</sub>	1,9	mg
Vitamin B <sub>1</sub>	1,4	mg
Vitamin B <sub>2</sub> /Riboflavin	3,8	mg
Vitamin B <sub>6</sub> /Pyridoxinhydrochlorid	3,8	mg
Vitamin B <sub>12</sub> /Cyanocobalamin	28,5	µg
Niacin	19	mg
Calcium-D-Pantothenat	12,8	mg
Cholinchlorid	285	mg
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat [E 1]	47,5	mg
Mangan als Mangan-(II)-oxid [E 5]	38	mg
Zink als Zinkoxid [E 6]	57	mg
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat [E 4]	11,9	mg
Calciumjodat, wasserfrei [3b202]	0,9	mg
Selen als Natriumselenit [E 8]	0,2	mg
gecoatetes Cobalt-(II)-carbonat-Granulat [3b304]	0,4	mg

## Fütterungsempfehlung:

Das Pulver ca. im Verhältnis 1:1,5 mit warmem Wasser anmischen [1 Volumenteil Pulver mit 1,5 Volumenteilen Wasser] bis ein sämiger Brei entsteht. Je nach Bedarf kann auch ein etwas flüssiger oder festerer Brei angerührt werden.

Sofern nicht anders mit Ihrem Tierarzt abgesprochen, erhalten die Tiere entsprechend ihres Körpergewichts ca. 60-80 ml angerührten Brei pro kg Körpergewicht täglich auf 5 bis 6 Mahlzeiten verteilt.

Bei Verfütterung in sehr dünnflüssiger Konsistenz (höherer Wassergehalt) sollte die Fütterungsmenge entsprechend erhöht werden.

Sehr schwache Tiere sollten möglichst häufig mit kleinen Mengen gefüttert werden.

Je nach Tierart, Gewicht, Alter und Zustand des Tieres kann die erforderliche Fütterungsmenge und Häufigkeit variieren und sollte deshalb mit dem Tierarzt abgestimmt werden.

Den Brei in einer Schale oder auf einem kleinen Löffel anbieten. Wenn keine freiwillige Nahrungsaufnahme mehr erfolgt, wird RodiCare® instant mit einer Spritze vorsichtig in kleinen Mengen in den seitlichen Maulwinkel verabreicht.

In der Übergangszeit von flüssiger zu fester Nahrung kann RodiCare® instant zu kleinen Teigklümpchen geformt verfüttert werden. Sobald das Tier wieder festes Futter zu sich nimmt, wird die RodiCare® instant-Ration entsprechend verringert.

Brei kühl lagern und innerhalb von 12 Stunden verbrauchen. Brei nicht gekühlt verfüttern.

## Hinweise:

Zusätzlich sollte immer gutes Heu und frisches Wasser zur freien Verfügung angeboten werden.

Da die vollständige Regeneration des Verdauungstraktes mehrere Wochen dauern kann, empfiehlt es sich, während und nach der Übergangszeit zu fester Nahrung zunächst RodiCare® basic-Pellets zu verfüttern.

Nicht über 25°C und trocken lagern!

Erhältlich in Ihrer Tierarztpraxis

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Infoblatt Päppelinformation ([www.alfavet.de](http://www.alfavet.de)).

**Haltbarkeit:** 18 Monate

## Handelsform:

60 x 20 g Beutel im Display  
170 g Dose  
2 kg Dose