

Gebrauchsanweisung: Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an ihren Arzt oder Apotheker.

ACNAID™ GEL Medizinprodukt

Acnaid™ Gel reduziert die Symptome von Akne vulgaris.

Acnaid™ Gel trägt zur Reduzierung bestehender und zur Verhinderung neuer Pickel und unreiner Haut bei.

Zusammensetzung:

Wasserstoffperoxid, Salicylsäure, D-Panthenol, Excipients.

Wirkprinzip: Die Kombination von Wasserstoffperoxid und Salicylsäure beseitigt eine große Anzahl von Mikroorganismen (z.B. Bakterien), die die Haut schädigen und die Voraussetzung für die Entstehung von Akne schaffen.

Acnaid™ Gel reduziert mögliche Rötung der Aknehaut. D-Panthenol durchfeuchtet die Haut und macht sie weich und geschmeidig.

Packungsgrößen:

Probiergröße mit 5ml. Originalgröße mit 30g

Aussehen, Geruch, Konsistenz: Farbloses Gel mit schwachem Geruch

Anwendungsgebiete: Reduziert die Symptome von Akne vulgaris.

Trägt bei zur Reduzierung von Anzahl und Größe bestehender Akne-Effloreszenzen (Papeln, Pusteln, Komedonen) und zur Verhinderung der Entstehung neuer Läsionen.

Warnhinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung auf unverletzter Haut. Enthält Wasserstoffperoxid. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei versehentlichem Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten mit viel Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich bitte an ihren Arzt.

Gegenanzeigen:

Acnaid™ Gel darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den einzelnen Bestandteilen nicht angewendet werden. Beim Auftreten von Unverträglichkeiten sollte ACNAID Gel sofort abgewaschen und abgesetzt werden. Acnaid™ Gel nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen.

Anwendung:

- Gesicht vor der Anwendung waschen
- Ausreichende Menge auf die betroffene Haut auftragen und einziehen lassen.
- Nicht abwaschen. Hände nach der Anwendung sorgfältig waschen.
- 1-2mal täglich anwenden. Anwendungsdauer bis zu 12 Wochen.

Aufbewahrungshinweis:

Kühl und trocken und nicht über 28° C lagern. Acnaid™ Gel soll nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hergestellt in Griechenland von: BODERM Laboratories PC.
6, Panou Gavalá str., Industrial Park Agios Stefanos, 14565,
Attica-Greece. t: +30 2108004250.

Product of GABRIEL Health pharmaceutical ltd, 6, Panou Gavalá str.,
Industrial Park Ag. Stefanos, 14565, Attica -Greece ,
t: +30 210 7707595.

CE 2803

Erklärung der Symbole auf dem Umkarton/Flasche/Etikett:



Hersteller



Temperaturbegrenzung
(unter 28°C lagern)



Anwendungshinweise
beachten



Chargennummer
(s. Aufdruck auf Flasche
und Faltschachtel)

EXP/

Nicht anwenden nach
Ablauf des
Haltbarkeitsdatums

Medizinprodukt