

**NL DEXYANE MED Oogleden**  
BEHANDELING VAN ATOPISCH ECZEM OF  
CONTACTECZEM TER HOOGTE VAN DE OOGLEDEN  
MEDISCH HULPMIDDEL

Baby's vanaf 3 maanden, kinderen, volwassenen

Wat zit er in DEXYANE MED Oogleden ?

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. GLYCERYL STEARATE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER. BEESWAX. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. GLYCYRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

In welke gevallen is DEXYANE MED Oogleden aangewezen ?

**DEXYANE MED Oogleden** is aangewezen voor de behandeling van atopisch eczeem of contacteczeem ter hoogte van de oogleden. Deze vormen van eczeem worden gekenmerkt door een beschadigde huidbarrière en een verhoogd risico op reacties op allergenen en irriterende factoren (uitdroging, irritatie, jeuk).

Hoe werkt DEXYANE MED Oogleden ?

1. Het **VERZACHT** onmiddellijk en ontzwellt.
2. Het **HERSTELT** de beschadigde huidbarrière en verbetert een droge huid dankzij de combinatie van glycerine, karitéboter en triglyceriden.
3. Het **VERZACHT** jeuk en pijn en vermindert de intensiteit van ontstekingsymptomen (roodheid en irritatie).
4. Het **BESCHERM**t de huid doordat de galenische vorm barstenloos natuurlijke polysacchariden een semioclusieve film op het huidoppervlak vormt.
5. Het **BEPERKT** bacteriële adhesie (met name van *S. aureus* die infectie van de letsels naar alle waarschijnlijkheid in de hand werkt).

De doeltreffende werking van **DEXYANE MED Oogleden** werd klinisch bewezen: het heeft een gunstig effect op de behandeling van eczeem ter hoogte van de oogleden:

- Wordt alleen gebruikt als eerste lijnsbehandeling van milde opflakkerende letsels: verzorgt de letsels en verzacht de pijn.
  - In combinatie met corticosteroiden voor matige tot ernstige opflakkerende letsels: verbetert hun efficiëntie en geeft sneller verlichting aan de patiënt, reeds na 3 dagen.
  - Als onderhoudsbehandeling na het gebruik van topische corticosteroiden, limiteert terugkerende letsels.
- Om de therapietrouw te bevorderen heeft **DEXYANE MED Oogleden** een aangename, sterk hydraterende en niet-plakkerige gel-crémétextuur die als een verzorgend verband werkt. De huid met eczeemletsels voelt weer soepel en comfortabel aan. Klinisch geteste tolerantie. Zonder cortisone, zonder parfum, getest op nikkel.

Hoe DEXYANE MED Oogleden gebruiken ?

Met een schone vinger 2 maal per dag een dunne laag crème rechtstreeks op de ontstoken eczeemletsels ter hoogte van de oogleden aanbrengen; contact met de ogen vermijden. Alleen voor uitwendig gebruik. Gebruik alleen of in combinatie met en/of ter afwisseling van dermo corticoiden. Indien gebruikt in combinatie met een democorticoïde, breng dan het democorticoïde aan en wacht enkele minuten (5-15 minuten) voordat u DEXYANE MED Oogleden aanbrengt.

Vraag uw arts om advies over het gebruik van DEXYANE MED Oogleden met het voorgeschreven dermo corticoid bij baby's ≥ 3 maanden en kinderen.

Raadpleeg een arts indien de symptomen na 3 weken behandeling niet zijn verdwenen.

Wat zijn de contra-indicaties voor het gebruik van DEXYANE MED Oogleden ?

Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de bestanddelen. In de afwezigheid van gegevens, niet geschikt voor zwangere vrouwen of voor vrouwen die borstvoeding geven.

Welke voorzorgsmaatregelen dient men in acht te nemen bij gebruik van DEXYANE MED Oogleden ?

Raadpleeg een arts in geval van een allergische reactie. Direct contact met de ogen vermijden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De tube na gebruik goed sluiten. Huidreacties op de plaats van aanbrengen (brandend gevoel, prikken, erytheem, jeuk, droogte...) zijn te verwachten bij patiënten met eczeem, aangezien deze patiënten een beschadigde huidbarrière hebben. Een tijdelijke verergering van het eczeem kan worden waargenomen. Raadpleeg een arts als er geen verbetering optreedt of als de eczeemsymptomen binnen 8-10 dagen verergeren. Raadpleeg een arts in geval van vijfelf en/of ongewenste bijwerkingen ten gevolge van het gebruik van het product. Als u reden heeft om aan te nemen dat zich in verband met het gebruik van het product een ernstig incident heeft voorgedaan, dient u dit aan de nationale autoriteit en de fabrikant te melden.

Tube 15 ml

Datum van herziening: 05/2023

CE-goedkeuring: 2019

**SL DEXYANE MED Palpebral**  
KREMA ZA ZDRAVLJENJE LEZIJ, ATOPISKEGA ALI  
KONTAKTNEGA EKCEMA NA OČESNIH VEKAH  
MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Dojenčki od 3.mesecca dalje - otroci - odrasli.

Kaj vsebuje DEXYANE MED Palpebral?

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. GLYCERYL STEARATE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER. BEESWAX. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. GLYCYRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYISOBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

Za kaj uporabljamo DEXYANE MED Palpebral?

**DEXYANE MED Palpebral** krema je namenjena za zdravljenje atopijskega ali kontaktnega ekcema na očesnih vekah. Za tovrstne ekceme je značilna spremenjena kožna bariera z velikim tveganjem za nastanek reakcij (suhost, razdraženost, srbenje) na alergene in dražje snovi.

Kako DEXYANE MED Palpebral deluje?

1. Tako **UBLAŽI** in pomirja.
2. **OBNAVLJA** spremenjeno kožno bariero in ublaži suhost kože zaradi kombinacije glicerola, karitejevega masla in trigliceridov.

3. **POMIRJA** občutek srbenja in bolečine, zmanjšuje rdečino in razdraženost.

4. **ŠČITI** kožo tako, da ustvari polprepustni površinski film, ki ga oblikuje z naravnim polisaharidom obogatena galenska formulacija.

5. **ZMANJSUJE** adhezijo bakterij (*S. aureus*, ki je potencialno lahko vpleten v superinfekcijo leziji).

Dokazana klinična učinkovitost: **DEXYANE MED Palpebral** izboljša zdravljenje ekcema na očesnih vekah:

- Samostojno kot prva izbira za zdravljenje lažjih oblik vnetih lezij; zdravi lezije in pomirja bolečino.
- V kombinaciji z dermalnim kortikosteroidom za zmerne do težje oblike vnetih lezij; izboljša njegovo učinkovitost in tako pacientu omogoča hitrejšo olajšanje, že po 3 dneh.
- Po zdravljenju z dermalnimi kortikosteroidi, zmanjšuje ponovitve nastanka lezij. Prijetna, nelepljiva, gel-krema tekstura z izjemnim vlažilnim učinkom zagotavlja uporabnikovo komplanco. Koži prizadeti z lezijami zaradi ekcema, povrne prožnost in občutek udobja. Klinično preizkušena toleranca. Brez kortizona, brez dišav, preizkušeno na nikelj.

Kako uporabljati DEXYANE MED Palpebral?

S čistim prstom dvakrat dnevno nanesite tanek sloj na vneto lezijo ekcema na očesni vekki. Pri tem se izogibajte neposrednemu stiku z očesom. Samo za zunanjo uporabo. Lahko se uporablja samostojno ali v kombinaciji z ali po dermalnem kortikosteroidom. Kadar se uporablja v kombinaciji z lokalnim kortikosteroidom nanesite lokalni kortikosteroid in počakajte nekaj minut (5-15 minut), preden nanesete DEXYANE MED Palpebral. Posvetujte se z zdravnikom glede uporabe izdelka DEXYANE MED Palpebral z lokalnim kortikosteroidom, predpisanim za dojenčke ≥ 3 mesecev in otroke. Če simptomi po 3 tednih zdravljenja ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

Katere so kontraindikacije pri uporabi DEXYANE MED

Palpebral?

Ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli sestavino. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov, ne uporabljajte, če ste noseči ali če dojite.

Kateri previdnostni ukrepi so potrebni pri uporabi DEXYANE MED Palpebral?









V primeru pojava alergijskih reakcij v povezavi z uporabo izdelka, se posvetujte z zdravnikom. Izogibajte se neposrednemu stiku z očmi. Hraniti izven dosega otrok. Po končani uporabi dobro zaprite tubo.

Pri osebah z ekcemom so pričakovane kožne reakcije na mestu aplikacije (pekoč občutek, zbadanje, eritem, srbenje, suhost ...), ker imajo te osebe spremenjeno kožno bariero. Možno je opaziti začasno poslabšanje ekcema. Če ni izboljšanja ali če se simptomi ekcema poslabšajo v 8 do 10 dneh, se posvetujte z zdravnikom. Če ste v dvomih glede neželenih učinkov, povezanih z uporabo tega izdelka, se posvetujte z zdravnikom. V primeru dvoma ali pojava neželenega učinka, povezanega z uporabo tega izdelka, obvestite lokalni pristojni organ in proizvajalca.

15 ml tuba

Datum revizije: 05/2023

Leto oznake CE: 2019

	Date de péremption Data di scadenza Verwendbar bis Validatum Rok uporabe
	Numero de lot Numero di lotto Chargenbezeichnung Lotnummer Številka serije
	Consultez la notice d'instruction Consultare le istruzioni d'uso Gebrauchsanweisung beachten Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Preberite navodila za uporabo
	Dispositif médical Dispositivo medico Medizinprodukt Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček
	Fabricant Fabbricante Hersteller Fabrikant Proizvajalec
	Péremption après ouverture : 3 mois Scadenza dopo l'apertura: 3 mesi Haltbarkeit nach dem Öffnen: 3 Monate Houdbaarheid na opening: 3 maanden Rok uporabe po odprtju: 3 mesece
	Date de fabrication Data di produzione Herstellungdatum Produktionsdatum Datum proizvodnje
	Conditions de conservation ≤25°C Condizioni di conservazione ≤25°C Lagerbedingungen ≤25°C Bewaaromstandigheden ≤25°C Pogoji shranjevanja ≤25°C
	Identifiant de dispositif unique Identificativo Unico del dispositivo Eindeutige Produktidentifikation Unieke hulpmiddelidentificatie Edinstveni identifikator pripomočka
	Mandatariе suisse Mandatario svizzero Schweizer Beauftragter Authorized representative in Switzerland Germachtigte Vertretungsverordneter in Switzerland

  
**Pierre Fabre**  
Dermo-Cosmétique  
**Laboratoires Dermatologiques Ducray**  
Les Cauquillois - 81500 Lavaur - France  
  
Pierre Fabre (Suisse) SA  
Hegenheimermattweg 183  
CH-4123 Allschwil  
  
**PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
Les Cauquillois  
81500 Lavaur - France



## FR DEXYANE MED Palpebral

### TRAITEMENT DES ECZÉMAS DES PAUPIÈRES

#### ATOPIQUES OU DE CONTACT

##### DISPOSITIF MÉDICAL

Bébés à partir de 3 mois, enfants, adultes

#### Que contient DEXYANE MED Palpebral ?

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. GLYCERYL STEARATE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER. BEESWAX. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. GLYCIRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYSORBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

#### Dans quels cas DEXYANE MED Palpebral est indiqué ?

**DEXYANE MED Palpebral** est indiqué dans le traitement des eczemas des paupières, atopiques ou de contact. Ces eczemas sont caractérisés par une barrière cutanée altérée avec un risque accru de réactions (sécheresse, irritations, démangeaisons) aux allergènes et agents irritants.

#### Comment fonctionne DEXYANE MED Palpebral ?

- SOULAGE** immédiatement et décongestionne.
  - RESTAURE** la barrière cutanée altérée et corrige la sécheresse grâce à l'association de glycérine, beurre de karité et triglycérides.
  - APAISE** les démangeaisons et la douleur, diminue les rougeurs et les irritations.
  - PROTÈGE** la peau en formant un film semi-occlusif de surface formé par sa galénique riche en polysaccharide naturel.
  - LIMITE** l'adhésion bactérienne (*S. aureus* potentiellement impliqué dans la surinfection des lésions).
- Son efficacité clinique a été démontrée : **DEXYANE MED Palpebral** améliore la prise en charge de l'eczéma des paupières :  
 - Seul en 1<sup>re</sup> intention sur les lésions en poussées légères : traite les lésions et apaise la douleur.  
 - En association aux dermatocorticoïdes sur les lésions en poussées modérées à sévères : accélère leur efficacité pour soulager plus rapidement les patients dès 3 jours.  
 - En relais des dermatocorticoïdes : limite la réapparition des lésions. Pour garantir une bonne observance, sa texture plaisir s'étale facilement et ne colle pas. Les peaux présentant des lésions d'eczéma retrouvent souplesse et confort.  
 Tolérance testée cliniquement. Ne contient ni cortisone, ni parfum, nickel testé.

#### Comment utiliser DEXYANE MED Palpebral ?

Appliquer 2 fois par jour en fine couche directement sur les lésions inflammatoires d'eczéma des paupières avec un doigt propre, en évitant tout contact avec l'œil. Usage externe seulement. À utiliser seul, en association et/ou en relais des dermatocorticoïdes. En cas d'association avec un dermatocorticoïde, appliquer le dermatocorticoïde et attendre quelques minutes (5-15 minutes) avant d'appliquer DEXYANE MED Palpebral. Demander conseil à votre médecin pour l'utilisation de DEXYANE MED Palpebral avec le dermatocorticoïde prescrit chez les bébés ≥ 3 mois et les enfants. Si les symptômes ne disparaissent pas après 3 semaines de traitement, consulter un médecin.

Quelles sont les contre-indications à l'utilisation de DEXYANE MED Palpebral ?

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants. En l'absence de données, ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

#### Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser DEXYANE MED Palpebral ?

En cas de réactions allergiques, consulter un médecin. Éviter tout contact direct avec les yeux. Tenir éloigné de la portée des enfants. Bien refermer le tube après utilisation. Des réactions cutanées au site d'application (sensation de brûlure, picotements, érythèmes, démangeaisons, sécheresse...) sont attendues chez les patients avec de l'eczéma car ces patients présentent une barrière cutanée altérée. Il est possible d'observer une aggravation temporaire de l'eczéma. En l'absence d'amélioration ou en cas d'aggravation des symptômes de l'eczéma dans les 8 à 10 jours, consulter un médecin. En cas de doute et/ou d'effets indésirables liés à l'utilisation du produit, consulter un médecin. Si vous avez des raisons de croire qu'un incident grave est survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, veuillez le reporter à l'autorité nationale et au fabricant.

Tube 15 ml

Date de révision : 05/2023

Année d'apposition du marquage CE : 2019

## IT DEXYANE MED Palpebre

### TRATTAMENTO DEGLI ECZEMI DELLE PALPEBRE

#### ATOPICI O DA CONTATTO

##### DISPOSITIVO MEDICO

Lattanti a partire dai 3 mesi - bambini - adulti

#### Cosa contiene DEXYANE MED Palpebre ?

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. GLYCERYL STEARATE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER. BEESWAX. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. GLYCIRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYSORBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

#### In quali casi è indicato DEXYANE MED Palpebre ?

**DEXYANE MED Palpebre** è indicato nel trattamento degli eczemi delle palpebre, atopici o da contatto. Questi eczemi sono caratterizzati da una barriera cutanea alterata con un aumentato rischio di reazioni (secchezza, irritazioni, prurito) agli allergeni e agli agenti irritanti.

#### Come funziona DEXYANE MED Palpebre ?

- ALLEVIA** immediatamente e decongestiona.
- RIPRISTINA** la barriera cutanea alterata e corregge la secchezza grazie all'associazione di glicerina, burro di karité e trigliceridi.
- LENISCE** il prurito e il dolore, riduce l'intensità dei segni dell'infiammazione (rossore e irritazione).
- PROTEGGE** la pelle grazie al film semi-occlusivo di superficie formato dalla sua formula galenica ricca in polisaccaride naturale.

5. **LIMITA** l'adesione batterica (*S. aureus* potenzialmente implicato nella sovra-infezione delle lesioni).

La sua efficacia clinica è stata dimostrata: **DEXYANE MED PALPEBRE** migliora il trattamento dell'eczema delle palpebre:

- Da solo come trattamento di prima linea per le riacutizzazioni in intensità lieve tratta le lesioni e lenisce il dolore.
- In associazione con corticosteroidi topici sulle lesioni che appaiono durante le riacutizzazioni di intensità da moderata a grave: migliora l'efficacia per dare un più rapido sollievo ai pazienti, dopo solo 3 giorni.
- Dopo il trattamento con corticosteroidi topici, limita la ricomparsa delle lesioni. Per favorire una buona aderenza al trattamento, la crema non è appiccicosa e si stende facilmente. Le pelli con lesioni da eczema ritrovano elasticità e comfort. Tollerabilità testata clinicamente. Non contiene né cortisone, né profumo. Testato per il nichel.

#### Come utilizzare DEXYANE MED Palpebre ?

Applicare uno strato sottile di prodotto 2 volte al giorno direttamente sulle lesioni infiammatorie dell'eczema delle palpebre usando un dito pulito, evitando qualsiasi contatto con gli occhi. Solo per uso esterno. Può essere usato da solo, in associazione e/o dopo l'uso di corticosteroidi topici. In caso di associazione con un corticosteroide topico, applicare il corticosteroide topico ed attendere qualche minuto (5-15 minuti) prima di applicare DEXYANE MED Palpebre. Chiedere consiglio al vostro medico per l'utilizzo di DEXYANE MED Palpebre con un corticosteroide topico prescritto per i lattanti ≥ 3 mesi e bambini. Se i sintomi persistono dopo 3 settimane di trattamento, consultare un medico.

#### Quali sono le controindicazioni nell'utilizzo di DEXYANE MED Palpebre ?

Non utilizzare se si è allergici a uno degli ingredienti. In mancanza di dati, non utilizzare durante la gravidanza o l'allattamento al seno.

#### Quali sono le precauzioni d'uso da prendere quando si usa DEXYANE MED Palpebre ?

In caso di reazioni allergiche, consultare un medico. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Chiedere bene il tubo dopo l'uso. Si possono manifestare delle reazioni cutanee nell'area di applicazione del prodotto (sensazione di calore, prurito, eritema, irritazioni, secchezza...) nel paziente affetto da eczema in quanto presenta una barriera cutanea alterata. Si può inoltre osservare un temporaneo peggioramento dell'eczema. In assenza di miglioramento o in caso di peggioramento dei sintomi dell'eczema, nei successivi 8-10 giorni, consultare un medico. In caso di dubbi e/o effetti indesiderati legati all'utilizzo del prodotto, consultare un medico. Se si ha un valido motivo di ritenere che si sia verificato un grave danno legato all'utilizzo del prodotto, si prega di contattare immediatamente l'autorità preposta ed il fabbricante.

Tubo da 15 ml

Data di creazione delle istruzioni d'uso: maggio 2023

Anno di apposizione del marchio CE: 2019

## DE DEXYANE MED

### AUGENLIDCREME

#### BEHANDLUNG VON ATOPISCHEN ODER

#### KONTAKTEKZEMEN DER AUGENLIDER

##### MEDIZINPRODUKT

Säuglinge ab 3 Monaten - Kinder - Erwachsene

#### Was enthält DEXYANE MED Augenlidcreme ?

WATER (AQUA). GLYCERIN. CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE. BUTYLENE GLYCOL. POLYSORBATE 60. GLYCERYL STEARATE. BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER. BEESWAX. PEG-100 STEARATE. 10-HYDROXYDECENOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. CETYL ALCOHOL. CITRIC ACID. GLYCIRRHETINIC ACID. POLYACRYLATE-13. POLYSORBUTENE. POLYSORBATE 20. SCLEROTIUM GUM. SORBITAN ISOSTEARATE.

#### In welchen Fällen wird DEXYANE MED Augenlidcreme angewendet ?

**DEXYANE MED** Augenlidcreme wird bei der Behandlung von atopischen oder Kontaktekzemen der Augenlider angewendet. Diese Ekzeme zeichnen sich durch eine gestörte Hautbarriere mit einem erhöhten Risiko von Hautreaktionen (Trockenheit, Irritationen, Juckreiz) auf Allergene und Reizstoffe aus.

#### Wie funktioniert DEXYANE MED Augenlidcreme ?

- SOFORTIGE LINDERUNG** und Abschwellung.
- REPARIERT** die geschädigte Hautbarriere und wirkt der Hauttrockenheit mit einer Kombination aus Glycerin, Sheabutter und Triglyceriden entgegen.
- LINDERT** Juckreiz und Schmerzen, reduziert Rötungen und Irritationen.
- SCHÜTZT** die Haut mit einem semi-okklusiven Film auf der Hautoberfläche durch eine Formulierung, die reich an natürlichen Polysacchariden ist.
- REDUZIERT** die bakterielle Anhaftung (*S. aureus* kann potentiell an Superinfektionen der Läsionen beteiligt sein).

Die Wirksamkeit wurde klinisch bestätigt: **DEXYANE MED** Augenlidcreme verbessert die Behandlung von Lidexzemen:

- Allein als Erstlinientherapie bei leichten Schüben: Behandelt Lidexzeme und lindert Schmerzen.
  - In Kombination mit topischen Kortikosteroiden bei mittleren bis schweren Schüben: Beschleunigt ihre Wirksamkeit, um nach nur 3 Tagen eine schnellere Linderung für den Patienten zu erreichen.
  - Im Anschluss an topische Kortikosteroide begrenzt sie das Wiederauftreten von Läsionen.
- Die Creme hat mit ihrer angenehmen, gelartigen Textur einen ultra-feuchtigkeitsspendenden Pflesterfekt und fühlt sich nicht klebrig an. Das gewährleistet eine gute Patienten-Compliance. Die von ekzembedingten Läsionen betroffene Haut findet wieder zu Geschmeidigkeit und Wohlgefühl zurück. Verträglichkeit klinisch überprüft. Enthält weder Kortison noch Duftstoffe. Nickelfrei.

#### Wie wird DEXYANE MED Augenlidcreme angewendet ?

2-mal täglich eine dünne Schicht mit einem sauberen Finger direkt auf die entzündlichen Ekzemläsionen auf den Augenlidern auftragen.

Dabei jeden Kontakt mit dem Auge vermeiden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Kann allein, in Kombination mit oder im Anschluss an topische Kortikosteroide verwendet werden.

In Kombination mit einem topischen Kortikosteroïd das topische Kortikosteroïd auftragen und einige Minuten (5-15 Minuten) warten, bevor DEXYANE MED Augenlidcreme angewendet wird. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat bei der Anwendung von DEXYANE MED Augenlidcreme bei Säuglingen ≥ 3 Monate und Kindern in Kombination mit einem verschriebenen topischen Kortikosteroïd. Wenn die Symptome nach 3 Wochen Anwendung nicht verschwunden sind, konsultieren Sie einen Arzt.

#### Welche Kontraindikationen gibt es für die Anwendung von DEXYANE MED Augenlidcreme ?

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden. Aufgrund fehlender Daten nicht für schwangere oder stillende Frauen geeignet.

#### Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen für die Anwendung von DEXYANE MED Augenlidcreme beachtet werden ?

Im Falle einer allergischen Reaktion einen Arzt aufsuchen. Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die Tube nach Gebrauch gut verschließen.

Reaktionen an der Applikationsstelle (Brennen, Stechen, Erythem, Juckreiz, Trockenheit...) sind bei Personen mit Ekzemen zu erwarten, da diese Personen eine gestörte Hautbarriere aufweisen. Es ist möglich, dass eine vorübergehende Verschlimmerung des Ekzems beobachtet wird. Wenn innerhalb von 8 bis 10 Tagen keine Besserung oder eine Verschlimmerung der Ekzemserscheinungen eintritt, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Im Zweifelsfall und/oder beim Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Produkts konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts aufgetreten ist, melden Sie dies bitte Ihrer nationalen Behörde und dem Hersteller.

15 ml Tube

Erstellungsdatum: 05/2023

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2019