

GEBRAUCHSINFORMATION

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch.



Hersteller:

SymbioPharm GmbH
Auf den Lüppen 10
35745 Herborn



Zusammensetzung:

1 Vaginalzäpfchen enthält: Weinsäure, Calcium-Lactat, Inulin, Hartfett

Sämtliche Schleimhäute des menschlichen Körpers sind nicht steril, sondern werden von den unterschiedlichsten Mikroorganismen besiedelt. Auf der Vaginalschleimhaut nehmen die Milchsäurebakterien eine besondere Stellung ein. Sie bilden innerhalb der Vaginalflora eine Schutzflora – die Döderleinflora. Diese produziert unterschiedliche, saure Stoffwechselprodukte und gibt diese an ihre unmittelbare Umgebung ab, mit der Folge, dass ein gesundes, saures Vaginalmilieu ein pH-Wert von 4 entsteht. Das saure Milieu sorgt dafür, dass sich unerwünschte Bakterien nicht so leicht vermehren und eventuell zu Infektionen führen können.

Das Medizinprodukt **SymbioVag® Lactat** unterstützt die Milchsäure bildenden Bakterien bei der Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes durch die enthaltenen, ansäuernden Substanzen.

Ein saures vaginales Milieu ist eine effektive Barriere gegen krankheitserregende Mikroorganismen.

Anwendungsgebiete:

Zur Herstellung und Erhalt eines physiologischen pH-Wertes in der Vagina. Dieser ist die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung einer physiologischen Scheidenflora. Unterschiedlichste Einflüsse wie die Einnahme von Medikamenten (Antibiotika oder Chemotherapeutika), entzündliche Erkrankungen der Scheide oder eine Schwangerschaft können zu einer Schwächung bzw. Zerstörung der natürlichen Schutzflora führen.

Gegenanzeigen:

SymbioVag® Lactat darf bei Überempfindlichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Weiterhin sollte **SymbioVag® Lactat** nicht während der Regelblutung verwendet werden.

Wechselwirkungen:

Hinweis: Bei gleichzeitiger Verwendung von **SymbioVag® Lactat** und Kondomen kann es, bedingt durch die Zusammensetzung von **SymbioVag® Lactat**, zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Dosierungsanleitung:

Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, führen Sie, am besten abends vor dem Schlafengehen, ein Vaginalzäpfchen tief in die Scheide ein.

Entnahme der Zäpfchen aus der Verpackung:

- Trennen Sie ein Zäpfchen an der Perforation von den restlichen ab.
- Reißen Sie von der Zäpfchenspitze her beginnend die PVC-Folie auseinander.
- Entnehmen Sie das Zäpfchen und führen es tief in die Scheide ein.

Die ununterbrochene Anwendung sollte 30 Tage nicht überschreiten.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es während der Anwendung von **SymbioVag® Lactat** zu einem Brennen bzw. Jucken im Intimbereich kommen. In diesen Fällen sollten Sie **SymbioVag® Lactat** nicht weiter anwenden und Ihren Arzt aufsuchen.

Aufbewahrungshinweis und Mindesthaltbarkeit:

SymbioVag® Lactat sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (Monat/Jahr) auf der Packung.

Stand der Information:

November 2019

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Mehr Informationen zu **SymbioVag® Lactat** finden Sie im Internet unter www.symbiopharm.de