



# novacalm<sup>®</sup>

## Pulver mit KiOtransine<sup>®</sup> und Simeticon

Zum Einnehmen  
ohne Wasser



Bitte lies Dir die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Du mit der Einnahme dieses Medizinprodukts beginnst. Falls Du Dir nicht sicher bist oder weitere Fragen hast, wende Dich bitte an Deinen Arzt oder an Deine Apotheke.

### Indikation

Novacalm ist für die symptomatische Behandlung von gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden bestimmt und wird angewendet zur:

- Linderung von gasbedingten Symptomen wie Völlegefühl, Blähungen, Flatulenz oder Bauchschmerzen
- Regulierung der Darmpassage und der Stuhlentleerung
- Normalisierung der Darmtätigkeit

### Dosierung und Anwendung

Novacalm ist zur Anwendung bei Erwachsenen bestimmt, die an akuten oder chronischen Magen-Darm-Störungen oder -Erkrankungen leiden.

Novacalm kann bis zu 3-mal täglich nach den Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen oral eingenommen werden. Gib dazu den Inhalt eines Beutels direkt in den Mund. Wasser ist für die Einnahme nicht erforderlich. Die Beutel sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Du kannst das Medizinprodukt je nach Bedarf bis zu 28 Tage lang hintereinander verwenden.

### Zusammensetzung

500 mg KiOtransine<sup>®</sup>, 250 mg Simeticon, Sorbitol, Siliciumdioxid, Gummi arabicum, Xanthan, Vanillearoma, Sucralose, Acesulfame K

Novacalm ist für die vegane Ernährung geeignet, glutenfrei, laktosefrei und enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe.

### Nebenwirkungen

Gelegentliche, nicht schwerwiegende Magen-Darm-Beschwerden: Sodbrennen, Magenschmerzen oder Verstopfung. Andere Verdauungsbeschwerden, wie z. B. Durchfall, können aufgrund der Anwesenheit von Sorbitol auftreten.

Selten: Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen.

Novacalm kann Sulfite und Vanillin enthalten, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bei anhaltenden Magen-Darm-Beschwerden oder Nebenwirkungen sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Meldung von Nebenwirkungen:

- [materiovigilance@kitozyme.com](mailto:materiovigilance@kitozyme.com)
- BfArM - [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)
- AGES - [www.ages.at](http://www.ages.at)

### Vorsichtsmaßnahmen für die Einnahme

Aufgrund seiner physikalisch-chemischen Struktur ist Simeticon in der Lage, die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln zu verringern, wie dies für Levothyroxin nachgewiesen wurde. Wenn Du Novacalm anwendest, solltest Du Deinen Arzt oder Apotheker systematisch nach Begleitbehandlungen fragen und Deine Medikamente mindestens 1 Stunde vor, oder 4 Stunden nach Novacalm einnehmen, um mögliche Wechselwirkungen zu vermeiden.

Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Während Schwangerschaft und Stillzeit darf Novacalm nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Gegenanzeigen

Das Medizinprodukt ist für folgende Personengruppen nicht geeignet:

- für Menschen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe
- für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

Dieses Medizinprodukt enthält 937,4 mg Sorbitol pro Beutel.

Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Konsultiere Deinen Arzt bevor Du dieses Medizinprodukt einnimmst oder erhältst, wenn Dein Arzt Dir mitgeteilt hat, dass Du eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern hast oder wenn bei Dir eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.


Die additive Wirkung gleichzeitig angewendeter Sorbitol (oder Fructose) -haltiger Produkte und die Einnahme von Sorbitol (oder Fructose) über die Nahrung ist zu berücksichtigen.

Der Sorbitolgehalt oral angewendeter Produkte kann die Bioverfügbarkeit von anderen gleichzeitig oral angewendeten Produkten beeinflussen.

### Lagerungsbedingungen

Novacalm ist trocken zu lagern. Stelle vor der Anwendung sicher, dass der Beutel unversehrt ist. Ein beschädigter oder bereits geöffneter Beutel ist wegzuwerfen. Verwende das Medizinprodukt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.


### Hersteller

 KitoZyme SA  
Parc Industriel des Hauts-Sarts,  
Zone 2  
Rue de Milmort, 680  
BE-4040 Herstal – Belgien


Vertrieb durch:  
Apricot Health GmbH  
Mehringdamm 57  
10961 Berlin

### Hast Du noch Fragen?

Nutze unsere kostenlose Beratung.

 **Telefon: 030 555 708 58**  
(Mo-Fr, 9-18 Uhr)

 **E-Mail: [service@apriwell.de](mailto:service@apriwell.de)**

 **WhatsApp: 01579 23 449 77**

Besuche uns auch im Internet:  
**[www.apriwell.de](http://www.apriwell.de)**

### Medizinprodukt

 0297