

PACKUNGSBEILAGE

GYNOLACTA

Vaginaltabletten

WAS IST GYNOLACTA UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

GYNOLACTA Vaginaltabletten für Frauen enthalten als Wirkstoff Milchsäure. Der vaginale pH-Wert liegt normalerweise zwischen 3,8 und 4,5, was auf einen sauren Zustand hinweist. Der Säuregehalt wird durch vaginale Milchsäurebakterien reguliert, die Milchsäure produzieren. Das saure Milieu hemmt die Überwucherung anderer Vaginalbakterien und verhindert das Wachstum pathogener Bakterien. Jede Veränderung des Säuregehalts führt zu ungewöhnlichem, übel riechendem Ausfluss.

Störung des bakteriellen Gleichgewichts in der Vagina (bakterielle Vaginose)

Der Säuregehalt der Vagina nimmt ab, wenn die Menge der Milchsäurebakterien abnimmt, was zu einem bakteriellen Ungleichgewicht führt. Ein bakterielles Ungleichgewicht und die daraus resultierenden Symptome sind bei Frauen weit verbreitet. Umstände wie eine Antibiotikabehandlung, die medikamentöse Behandlung einer Hefepilzinfektion, Menstruationsblutungen, Schwangerschaft, Geschlechtsverkehr, die Wechseljahre und übertriebene Intimhygiene erhöhen die Anfälligkeit für eine bakterielle Vaginose. Das häufigste Symptom der bakteriellen Vaginose ist vermehrter milchiger oder gräulicher Ausfluss mit einem typisch unangenehmen Geruch. Außerdem kann es zu einem leichten Juckreiz kommen. In der Regel liegt keine Entzündung vor.

GYNOLACTA wird bei bakterieller Vaginose und deren Vorbeugung eingesetzt, um den natürlichen Säuregehalt der Vagina wiederherzustellen und zu erhalten.

DIE ZUSAMMENSETZUNG VON GYNOLACTA

Jede Vaginaltablette enthält 50 mg Milchsäure. Die sonstigen Bestandteile sind Calciumlactat, Lactose, Hydroxypropylmethylcellulose, Talkum und Magnesiumstearat. Das Produkt ist unparfümiert und enthält keine Farbstoffe.

WIE IST GYNOLACTA ANZUWENDEN?

Gebrauchsanweisung und Dosierung bei bakterieller Vaginose:

Führen Sie an 7 Abenden vor dem Schlafengehen eine Vaginaltablette mit den Fingern tief in Ihre Vagina ein.

Gebrauchsanweisung und Dosierung bei der Prävention von bakterieller Vaginose:

Führen Sie an 3 Abenden vor dem Schlafengehen eine Vaginaltablette mit den Fingern tief in Ihre Vagina ein.

Die Behandlungsdauer kann nach ärztlicher Verordnung verlängert und wiederholt werden (Höchstdauer der Anwendung 14 Tage).

Gynolacta kann während der Menstruation angewendet werden.

Nehmen Sie die Tablette vorsichtig aus der Blisterpackung, damit sie nicht zerbricht.

Halbieren Sie die Vaginaltablette nicht. Die Tablette sollte ganz eingeführt werden.

Achten Sie bei der Verabreichung des Produkts auf eine gute Handhygiene.

Einen Arzt kontaktieren,

- wenn sich Ihre Symptome während der Behandlung verschlimmern;
- wenn Ihre Symptome nach 7 Tagen der Behandlung weiter bestehen.

Schwangerschaft und Stillzeit

GYNOLACTA kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

GYNOLACTA DARF NICHT ANGEWENDET WERDEN,

- wenn Sie starken Juckreiz oder Schmerzen in der Vagina haben. In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- wenn Sie blutigen Ausfluss haben (keine Menstruationsblutung). In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
- wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts sind.
- wenn Sie schwanger werden wollen, denn die Vaginaltablette senkt den pH-Wert der Vagina und kann die Bedingungen für Spermien verschlechtern.
- wenn die Blisterpackung kaputt ist.
- wenn die Vaginaltablette beschädigt ist.
- nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- als ein Kontrazeptivum.

WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Vorübergehende lokale Reizung, wie z. B. ein brennendes Gefühl.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalles melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes.

WIE IST GYNOLACTA AUFZUBEWAHREN UND ZU ENTSORGEN

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur unter 25 °C in der Originalverpackung. Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Packungsgröße:

Blisterpackung mit 8 Vaginaltabletten

Hersteller und Vermarkter

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500
Hämeenlinna, Finnland
Tel. +358 3 615 600

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet am 04.10.2023.



0537



Hersteller und Vermarkter



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



25 °C

Obere Temperaturbegrenzung



Medizinprodukt