

GAVIDarm Häufiger Durchfall

WIRKUNGSWEISE

Die Darmschutz Technologie auf Basis von Xyloglucan aus Tamarindensamen bildet in Kombination mit Erbsenprotein eine Schutzbarriere an den Darmwänden. Diese Formulierung wurde mit Xylo-Oligosacchariden kombiniert und trägt zusätzlich dadurch zur Verringerung von Durchfällen bei. Die Wirksamkeit dieses Produktes bei Durchfall wurde in klinischen Studien nachgewiesen.

- Behandelt wirksam wiederkehrenden Durchfall für eine langfristige Linderung
- Hilft bei der Vorbeugung wiederkehrender Reizdarmsymptome wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen
- Bildet einen Schutzfilm, der die Darmschleimhaut beruhigt, stärkt und ihre Regenerierung fördert

ANWENDUNGSGEBIET

GAVIDarm Häufiger Durchfall ist ein Medizinprodukt, das die Darmfunktion bei Patienten stabilisiert, die aufgrund des Reizdarmsyndroms unter Durchfall leiden. Es kann auch bei Durchfall aufgrund anderer Faktoren, die zu einer gestörten Darmbarriere führen, angewendet werden.

DOSIERUNG

Erwachsene ab 18 Jahren: 1-2 Kapseln, je nach Schwere der Symptome, zweimal täglich (morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen). Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, sollten Sie die Behandlung 2 Wochen lang durchführen und bei Bedarf unter ärztlicher Aufsicht fortsetzen. Im Falle einer Überdosierung wenden Sie sich bitte umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder an eine Apotheke.

ANWENDUNGSHINWEIS

Nehmen Sie die Kapseln mit Flüssigkeit ein.

Eine Kapsel enthält:

Inhaltsstoffe: 210,6 mg Xylo-Oligosaccharide, 175 mg Erbsenprotein, 100 mg Tamarindensamen-Polysaccharid (Xyloglucan), 75 mg Traubenkernextrakt.

Sonstige Stoffe: Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs), Siliciumdioxid.

Kapselhülle: Hypromellose, Titandioxid.

WARNHINWEISE

- Es ist nicht notwendig, vor der Anwendung des Produkts eine Ärztin oder einen Arzt zu konsultieren. Ein Arztbesuch ist anzuraten bei schweren oder anhaltenden Symptomen oder wenn Zweifel an der Diagnose bestehen, vor allem bei älteren Menschen. Wenn Sie sich im Hinblick auf die Diagnose nicht sicher sind oder schwere Symptome auftreten, suchen Sie unbedingt sofort eine Ärztin oder einen Arzt auf.
- Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke, wenn Sie gleichzeitig mit diesem Medizinprodukt Arzneimittel einnehmen.
- Es wird empfohlen, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit zu verwenden. Konsultieren Sie in diesem Fall vor der Einnahme Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Blister geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht bei Temperaturen über 25 °C lagern. Nicht in den Gefrierschrank legen.

3315876

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Unerwünschte Nebenwirkungen sollten umgehend einer Ärztin, einem Arzt, einer Apotheke oder an Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg gemeldet werden. Schwerwiegende Vorfälle müssen Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die Sie über das weitere Vorgehen informieren wird.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

Nehmen Sie dieses Medizinprodukt nicht ein bei bekannter Überempfindlichkeit gegen seine Bestandteile, bei Darmperforation und/oder Magen-Darm-Verschluss. Dieses Medizinprodukt ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet.

WECHSELWIRKUNGEN

Wenngleich keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt sind, ist es ratsam, eine Ärztin, einen Arzt oder eine Apotheke zu konsultieren, bevor Sie das Produkt zusammen mit Arzneimitteln einnehmen.

NEBENWIRKUNGEN

Unabhängig von der individuellen Verträglichkeit wurde die Behandlung mit diesem Produkt als gut verträglich eingestuft. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Die Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Ergebnisse (SSCP) ist in EUDAMED verfügbar (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Sie können darauf zugreifen, indem Sie die BASIC UDI-DI eingeben: 7649993626FT42301VC

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate und das Verfallsdatum ist auf der Packung und auf dem Blister angegeben. Die Angaben auf dem Blister beziehen sich auf das Produkt in der unangebrochenen Verpackung bei korrekter Lagerung. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Verfallsdatum oder wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Bewahren Sie das Medizinprodukt dicht verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort (unter 25 °C) auf. Das Produkt darf weder Hitzequellen noch Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

PACKUNGSGRÖSSE

Das Medizinprodukt ist für Erwachsene bestimmt und in Blisterpackungen mit 8 Kapseln, 15 Kapseln, 30 Kapseln oder 60 Kapseln erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

ENTSORGUNG

Das abgelaufene oder zu entsorgende Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.



DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia 14
6900 Lugano - Schweiz



Devintec Health S.L.
Calle General Pardiñas 99
28006 Madrid (Spanien)



Import durch: Reckitt Benckiser Deutschland GmbH,
Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg
GAVIDarm ist eine Marke der
Reckitt-Unternehmensgruppe

REV.00 21.11.2024



C05802E008DE
C05802E030DE



500000004186-00

3315876